
EX LIBRIS · MILDRED BLISS · DUMBARTON OAKS
AT THE GATE OF DAWN

BOCCONE

MUSEUM RARIORUM PLANTARUM NOMINIBUS LINNÆI SPECIFICIS ILLUSTRATUM.

AB

ALOYSIO CABRINI 1791.



Pseudo-Dictamnum nigro rotundo, crispo folio. est

Marrubium-crispum Linn. Cl. XIV.

Vid. fray. in tab. 131.

Praefatio & Operis ratio.

Dum me ad Botanicae studium dedicare, voluptatem haud paucam et utilem mihi afferre excogitabam. tot tantorum hominum illustrium vestigia sequutus, non labori, non sudoribus, neque impensis peperci ad incommodas per accliviores Appeninos montes peregrinationes suscipiendas, nec non diuturnas intra patriam herborisationes. Tum classicorum Autorum opera reconsulebam, inter quae ea cl. Linnaei frequentius. In speciebus recognoscendis Musei Patr. Bocconi panormitani Ill. Vir magni faciebat. Quidam Medicus amicus illud mihi rarum opus gratè mutuabat. Hoc restituto hinc quanti esse faciendum, et quam mihi fore necessarium praevidebam. Optimum ideo duxi rudíter ab eo imitare tabulas, hisce praeter sua Linnaei generica, nec non specifica nomina, frasesque inscribere, ultas Ill. Halleri notas ad lumen revocare; hinc demum in colligando opus sexdecim alteras addere icones quae nesciendo ubi eas inserere, in botanices oblectamentis mihi specimen dabant, et sunt: (1) Jacea-Intybacea, idest Centaurea-nudicaulis Linnaei, quae ex cel. Scopoli sententia, quum sit planta adhuc in propria specie obscura, ideo ipsius Linnaei herbarium a cl. Smithio Londini possessum esset consulendum ut ad quam ex duobus iconibus pertineat decideremus. (2) Campanula-Erinus Linn. lecta in peculiari viridario Maceratae atque abbunde in Piceni peregrinationibus reperta, etiam Viola-grandiflora, quae videtur confondere cum sequenti (3) Viola-calcarata prope Nursiae appenninos passim collecta ambae Violae-Tricoloris L. progenies. (4) Thea-Bohea L. species in mensae deliciis vera et admodum diversa a Thee-Sinensium sive Tsia-Japonica in hocce Bocconis Museo tab. 94. exculpta. (5) Coffea-arabica Linn. Coffeae-occidentalis exquisitior. (6) Aristolochia-longa vera offic.

officinarum regni neapolitani incola, quam plurimi pharmacopoei
certe ignoravit, inscienterque Clematite pro longa Aristolochia utun-
-tur et venditant. (7) Assarum-officinarum, cujus radices ma-
-jori datae dosi exoticae Ipecachuanae succedaneae ex cel. Amico
medico mihi ordinatae multoties suppeditavi. (8) Uva ursi offici-
-narum herba in calculosis tam praestantior ne mihi cum (9) Vite-
-Idaea confonderetur libentius comparata. (10) Croton-tinctorium
primus credo inter botanicae peregrinatores Italiae Appeninorum in-
-colam invenisse, romani agri vinetis etiam familiarem. quam optan-
-dum Itali ad instar Belgii, Galli &c. pro re tinctoria adhiberent! (11) Co-
-munissimum Solanum-nigrum, (12) Calendula-officinalis,
(13) Prunus-spinosa, (14) Ageratum-officinarum, (15) Rosa
gallica, (16) Geranium-malacoides Linn. quae moenia
Piceni urbium passim inhabitat, quarum conplurimas Florae
Piceni catalogus, ac Prodromus jam incohatus enumerabat. At
optimorum mecenatum deficientia fataque adversa prohibuerunt.

ex Tab. I.



Pentaphyllum alpinum, minimum profundo dissectum.



Salix alpina, Serpilli folio, lucido. est Salix retusa Linnaei Class. 22.



Pentaphyllum alpinum minimum profundo dissectum.
Alchemilla-pentaphyllæ Linn.
secund. Gmelin.



Veronica alpina pumila caule aphyllo.



Salix alpina rotundo Alni **folio repens.** est
Salix-herbacea Linn. Classe. XXII.
Salix foliis serratis, glabris, orbiculatis. Syst. Veg. ed. 14.
In alpibus Lapponiæ, Helvetiæ &c. ♃.






Alchimilla alpina lobis fim-
-briatis. est
Alchemilla-pentaphyllæa Lin. Cl. IV.
A. foliis quinatis multifidis glabris. Systema Veget.
edition. 14.
In Helvetiæ &c. montibus. ♃.



Salix alpina Serpilli folio lucido. est
Salix- retusa Linn. Cl. XXII.
Salix foliis subserratis, glabris, obovatis, obtusissimis.
Syst. Veg. Ed. 14
In alpibus Helvetiæ, Austriæ, Italiæ. ♃.

ex Tab. 2



Muscus montanus Adianthi foliis: est
Trichomanes-cambrigensa Linnæi, Classe XXIV.
T. frondibus pinnatis: pinnis oblongis dichotomis currentibus dentatis. Huds. Angl.
In Anglia, Italia, Jamaica



Centaurea calyce recurvato plumoso: foliis lanceolatis, subdentatis, tomentosis. Syst. Veg. ed. 14.
In pratis alpinis ♃.

Cyanus alpinus capitulo reticulato. an
Centaurea-uniflora Linnæi Classe. XIX.? sed dentes non sunt; et fol. nimis angusta, et petiolata. Vitman N^o. 9.

VI



Centaurea calycibus serratis: foliis lanceolato de-
-currentibus: caule simplici unifloro, raro bifloro.
Syst. Veg. ed. 14. In alpibus.

ex Tab. 2.

Variat flore albo, foliis parum decurrentibus, incisis
(sicut ex hac icone): floribus etiam minoribus.



Cyanus montanus caule folioso. est=
Centaurea-montana Linn. Cl. 19.




Libanotis alpina latifolia semine crispo: est
Laserpitium- latifolium Linnæi. Cl. 5.
ex Reichard.
Laserpitium foliolis |oblique| cordatis inciso-serratis. Syst. Veget. 14.
Habitat in Europa nemoribus siccis. ♃.




VII.
Tab. 4
Chrysanthémum exoticum incano Cinerariæ
lucido folio.
Aparine aquæ innatans
Fervisana, foliis Perchepier, capreolata



VIII. ex Tab. 5.



Gyps. foliis lanceolatis subtrinerviis: caulibus rectis. Syst. Veg. ed. 14. In Sibiria: ♃.


Sibiriam non peragravit Bocconius ideo vide contra *

* Gypsophila - prostrata Lamarck G. foliis lineari lanceolatis caulibus prostratis diffusis corollis campanulatis emarginatis ex albo purpurascentibus

Gypsophila-~~repens~~ altissima Linn. Cl. 10.

Caryophyllus alpinus, crasso, Linariæ folio. Boccone.

IX   ex Tab. 5.



Plantago alpina folio nigricante. est
Plantaginis-lanceolatæ Linnæi varietas Cl. IV.
ex Hallero.

Lysimachia siliquosa, trifoliata alpina-
purpurea.
Epilobii-montani Linnæi Varietas ex Hallero



X ex Tab. 6.



* Gentiana caulescens Lam.

Gentianella purpurea Violae Marianae flore. est
Gentiana acaulis Linnæi Classe V. non est. imo *
Gentiana corolla quinquefida campanulata caulem excedente Syst.
Veg. ed. 14. In Alpibus Helvetiæ, Austriæ, in Pyrenæis. ♃.




ex tab. 6.



Scabiosa hirsuta, multifida, alpina, supina. est
Scabiosa-tomentosa Linnai Classe IV. ex Sum. pl. Wi
Scab. caule unifloro, foliis tomentosis imis pinnatis pinnis dentatis et semipinnatis: caulinis pinnatis. Syst. Veg. ed. 14. Haller hist. n. 207.
In Helvetia Cl.
Scab. pyrenaica Allioni
Fl. ped. t. 25. f. 2.

Gentianella purp. Viole marianae flore.



Beccabunga alpina, angustifolia, repens.



XIII. ex Tab. 7



Polygonum montanum niveum, roseum, minus, compactioribus foli-
-olis Cyrneum.

Illecebrum - capitatum Linn. Cl. V

Illecebr. floribus bracteis nitidis occultantibus capitula terminalia
caulibus erectiusculis, foliis ciliatis, subtus villosis.

Paronychia caule fruticoso, prostrato, foliis muticis, pubescentibus,
ciliatis imbricatis Lamarck. melius.

in Gallia Narbonensi, Hispania, oriente habitat.

Condrilla Cyanoides vid. in t. 66.

XIV.

ex tab. 7



Veronica alpina, rotundo, Alsines Plantaginis-
-folio.

Chondrilla-cyanoides C.B. vid. 7. 66.

Iacobea pumila alpina. est



Senecio incanus Linn. Cl. XIX
Senecio corollis radiantibus: foliis utrimque tomentosis subpinnatis obtusis: corymbo subrotundo. Syst. Veget. ed. 14.
In Alpibus Helvetiæ, Austriæ &c.
♃.



Heptaphyllum trifoliatum argenteum italicum.

XVI ex Tab. 8.



Muscus cornucopioides cristatus.



Eufrasia erecta foliis subrotundis.

XVII ex Tab. 9



Pimpinella auriculata Sabauda rigida est
Sanguisorba auriculata Linnæi. Classe IV. ex
Scopoli Flor. Carniol. ed. 2.

XVIII

vc Tab. 9.





I. Veronica alpina pumila, caule aphyllo. est
Veronica aphylla Linn. Cl. 2
Ver. corymbo terminali: scapo sæpe nudo. Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Europæ australis. ♃.

II. Veronica minima Clinopodii min: folio, Romana. est eadem in tab. 102
~~Veronica aphylla Linn. Cl. 2.~~



III. Heptaphyllum alpinum, trifoliatum Sabaudum.
est
Potentilla nitida Linnæi. Cl. 12.
subacaulis ex Scopoli et [illegible]

XIX. ex Tab. 10.



Veronica frutescens, durior Patavina.

XX. *a Tab. 10.*



Chamæcistus supinus Hyssopi foliis villosis.

Alza da terra poco. Fiorisce [illegible], e cresce alle mon-tagne dell' Umbria. Sapor. [illegible], e [illegible]. [illegible]



XXI. ex Tab. 10



VERONICA MAS ALPINA GLABRA ERECTA.

XXII ex Tab. 11.



Hypericum guttis sanguineis. est
Hypericum - maculatum Lin. Cl. XIV.
Allion: flor. Pedem. tab. 83. f. 1.



A. Helleborus niger sanguineo folio. est
Hellebori-viridis - Linn. Cl. XIII. varietas.
ex Hallero Hist. helv. nº 1192

XXIII ex Tab. II.



Helleborus niger, foliis dissectis. est an Helleborus [illegible] Linnaei.?






Hyperici crispi, triquetro, et cuspidato folio Exordium. Vide Tab. sequentem.

XXV

ex Tab. 12



Hypericum crispum, triquetro, et cuspidato folio. est

Hypericum - crispum Linnaei Classe XVIII.

Hyp. floribus trigynis, caule tereti, foliis sessilibus lanceolatis basi undu-
-lato-dentatis. Syst. Veg. ed. 14.

In Calabria, Sicilia, Græcia ♃.

XXVI

ex Tab. 13



Ledum folio Sampsuci.

Marum tenuifolium Thymi facie Hisp.



XXVII exc Tab. 13.



Horminum subrotundo folio flore cæsio Hisp.



Carlina angusto, longo, et incano folio, Alpina.



XXIX

ex T. 15.



Tithymalo Cyparissias affinis, lato Leucoy folio, erecta, non ramosa.



XXX

ex Tab. 15.



Lysimachia siliquosa, alpina, erecta, Alsine foliis.

XXXI



Virga aurea alpina, laurinis rigidioribus foliis.

XXXII ex T. 16.




Lysimachia alpina, glabra, ramosa Violæ surrectæ foliis splendentibus.

Epilobii montani varietas β Linnæi Classe VIII. ex Hallero.

Variat in foliis, quæ quandoque subsessilia, angustiora nitida terna quaterna. In siccis adnata admodum parva ex Vitman. Epilob. fol. [imis] oppositis, ovatis, dentatis. Syst. Veg. ed. 14.

XXXIII T. 17



Iacea saxcatilis, longo, incano angusto Heliochrisi cretici folio. est
Centaureæ amaræ Linnæi varietas β. classe XIX.

Cent. calycibus scariosis: caulibus plerumque decumbentibus: foliis lanceolatis.
Syst. veget. ed. 14. In Italia, Mospelii &c.



Aster montanus angusto nervoso Plantaginis folio: est
Inula-ensifolia Linnaei Classe XIX.

Inula foliis sessilibus linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis: caule sub-unifloro
Syst. Veg. ed. 14

XXXV

ex Tab. 19




Cytisus præcox, spicatus, rubello flore, caule rubro.



XXXVI ex Tàb. 19.



Cerefolium rugoso Angelicæ folio, aromaticum. es.
Chærophyllum aromaticum Linnæi Classe V.
Chæroph. caule æquali: foliolis cordatis, serratis, integris: fructibus biaristatis. Syst. Veg. ed. 14
In Austria, Lusitania &c. ♃.



Pastinaca tenuifolia, lucida, [illegible] gummi manans. est:

Daucus – gumifer Linnæi Cl. V. ex Illustrat. ad Spec. Plant. Gouanii.

Daucus seminibus aculeatis: flosculo centrali sterili, nullo: caule nitido.

Ad mare et in agro Niceænsi. ♂



XXXVIII

ex Tab. 21



Sideritis montana erecta Salviæ glabro folio.

XXXIX

ex Tab. 21.



Sideritis alpina, Chamædryodes tomentoso folio.

XL T. 22.



Sempervivum omnium minimum, repens, Polygoni facie
AA ex naturali sua magnitudine plantæ.
BBB lente auctum.

est Tillæa-muscosa Linnæi Classe IV.
Genera nova Michelii tab. 20.

XLI

ex T. 13



Sideritis alpina, Chamædryoides, glabra.

XLII

ex Tab. ~~32~~ .23.



Lamium subrotundo rugoso folio flore rubro. est
Lamium - lævigatum Linnæi Classe XIV.
Lamium foliis cordatis, rugosis: caule lævi: calycibus glabris, longitu-
- dine tubi corollæ. Syst. Veg. ed. 14
In Italia, Elvetia, Sibivia ♃.

XLIII ex Tab. 24



Hieracium alpinum incanum saxatile Prunellæ foliis integris Ital.
est
Hieracium-pumilum Linnæi Classe XIX. ex Syst. Veg. ed. 14
Hier. foliis ovatis, petiolis dilatatis; scapis subunifloris. In Alpib. Helv. Sabaud.
♃.

XLIV

ex T. 24



Anthilloides rotundifolia sicula Euphrasiæ floribus rubentibus. est
Salsola-polyclonos Linnæi, Classe V., in Siciliæ, Hispaniæ maritimis habitat.
Sals. sublignosa, diffusa; foliis oblongis: calycibus marginatis, glomeratis coloratis. Syst. Veg. ed. 14.
Caulis ramosissim. diffusus. Folia mutica, carnosa. Flores axillares et terminales, glomerati sessiles.
Calyx infundibuliformis, quinque partitus, membranaceus, limbo parvo plano; colorato. Vitmani.

XLV T. 25.



Tanacetum album, tenuifolium, flore candido. est
Anthemis-austriaca Linn. Cl. XIX. Syst. Veg. ed. 14.
Anth. receptaculis conicis. paleis oblongis, mucronatis: seminibus nudis: foliis bipinnatis, lanuginoso-villosis. Habitat inter segetes et ad vias.

XLVI

ex Tab. 26. A.



Iacea supina maritima laciniata, capite spinoso, flore rubello. est
Centaurea-aspera Linnæi. Classe XIX.



XLVII ex Tab. 26. B



Eadem Iacea tabulæ præcedentis A. 26.

Cent. calycibus palmato-trispinosis: foliis lanceolatis, dentatis. Syst. Veg. ed. 14.



XLVIII ex Tab. 27



Chamæstæchas Hispanica.



XLIX ex Tab. 27.



Persicaria alpina folio nigricante, floribus albis. est
Polygoni-divaricati varietas β Linnæi, Classe VIII. vid. Spec. ad t. 83
Polyg. floribus octandris, trigynis racemosis foliis lanceolatis caule divaricato patulo Syst. Veg. ed. 14. In Helvetiæ, Sibiriæ, Corsicæ pratis alpium. ♃.
Polygonum caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subhirsutis spicis paniculatis. ex Hallero in hist. stirp. Helv. No. 1564. t. 2. fol. 261. [illegible]

ex recentium observationibus Willdenow et Lamarckii est
Polyganum-alpinum quum characteres specifici a
Polygano-divaricato Linn. eum separant.

 ex Tab. 27.



Lobelia- minuta Linn. Cl. XIX

Rapunculus aquaticus, minimus, repens, alpinus, Bellidis folio, flore cœruleo inaperto. est
Lobelia-Laurentia Linnæi, Classe XIX.

Lobel. caule prostrato, ramoso: foliis lanceolato-ovalibus, crenatis: pedunculis solitariis, unifloris, longissimis. † Syst. Veg. ed. 14. = In Italia, Creta ☉

LI T. 28.



Calcitrapa, amplo Jaceæ capitulo, stipatis spinis armato.

LII ex Tab. 28



Chamæleon alpinus, Sonchi spinosis foliis, radice nigra.

LIII Tab. 29

Thlaspi fruticosum Leucoij folio latifolium platycarpon. B. p.

Iberis semperflorens Linnæi.



ec Tab. 29.



Bellis montana, ramosa, glabra, Chrysanthemi segetum laciniatis foliis.





Virga aurea longo, molli, et lanceolato folio alpina.

LVI

T. 31



Sonchus pyramidalis Pratolini.



LVII

T. 32.




Serratula præalta angusto Plantaginis aut Persici folio. est
Serratula-præalta Linnæi, classe XIX.

LVIII ex Tab. 33



Convolvulus minimus angusto, auriculato folio. est
Convolvuli arvensis Varietas β. Linnæi Classe V

LIX ex Tab. 33



Convolvulus minimus angusto, brevi folio.

LX ex Tab. 34



Abrotanum foem. incanum, albo Achilleæ flore, creticum.



LXI

ex Tab. 34



Anagallis erecta, Bugulæ foliis, fructu rotundo.



LXII **T. 35.**



Cytisus nanus, frutescens, totus incanus, si-liqua acuta, perennis.

Bellis minima pratensis caule folioso. est

Bellis annua Linnæi Classe XIX. [illegible]

Bellis caule subfolioso. Syst. Veg. ed. 14. ⊙ *habitat in Sicilia,* [illegible]*, hispania,* [illegible]


LXIII

ex Tab. 36



Nepeta tuberosa, spicata, purpurea, Hispanica. est
Nepetæ - tuberosæ Linnæi Varietas β classe XIV.

a. Spicæ Verticillus ex Bracteis numerosis, erectis, ovatis, acutis, nervosis, rubro coloratis, margine pubescentibus Calyces bb obtegentibus.



LXIV ex Tab. 36




Nepeta saxatilis cærulea, minima, hispanica.

LXV ex Tab. 36.



Nepeta montana purpurea, major, sparsa spica. est
Nepeta- violacea Linnæi. Classe XIV.

LXVI ex Tab. 37.



Helichrysum siculum trifidis foliis asperiusculis siculum
Tanacetum-pilosum Bergii var. B,

LXVII ex Tab. 37.



Serratula præalta Centauroides montana Italica. est Serratula-coronata Linnæi. Classe XIX. an potius Serratulæ-tinctoriæ ejusdem varietas?




LXVIII ex Tab. 38.



Origanum lignosum Siracusanum, umbella amplissima. est
Origanum-onites Linnæi. Classe XIV.

LXIX ex Tab. 38.



Calamintha montana præalta, Pulegii odore. est
Melissæ-Nepetæ Linnæi. Classe XIV. varietas β

LXX. T. 39



Thlaspi parvum Halimi angusto argenteo folio. est
Alyssum-Halimifolium Linnæi class. XV.
Alyss. caulibus procumbentibus per-
-ennantibus: fol. lanceolato-li-
-nearibus acutis integerrimis.
Syst. Veg. ed. 14.
In Europæ australis aridis. ♄.

Amaranthus foliis acutis incanis Molluginis facie Zeilanica. est
Achyranthes-corymbosa Linnæi. Classe V. edit. 14.

LXXI

ex Tab. 40.



Calamintha prœalta Pulegii odore. est Varietas Melissœ-Nepetœ Linnœi. vide Tab. 38

LXXII

ex Tab. 40.



Calamintha montana præstantior flore purpureo.

LXXIII

ex Tab. 41.



Polygonum fruticans maritimum crassioribus flagellis ἄφυλλον



Turritis foliis caulem ambientibus polyceration. est

Arabis Bellidi-folia Linnæi, Classe XV.

Arab. foliis subdentatis radicalibus obovatis caulinis lanceolatis. Syst. veg. ed. 14.

In Alpibus. ♃.



LXXIV

ex Tab. 41.



Antirrhinum latifolium, pallidum, amplo flore
est
Antirrhinum majus Linnæi. Classe XIV.

LXXV ex Tab. 42



Lychnis corollaria umbellifera, alpina, flore purpureo. est
Agrostemma-Flos Jovis. Linnæi. Classe X.
Agrostemma-tomentosa: petalis emarginatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Helvetia, Palatinatu, Pedemontio, ad rupes. ♃.

Caulis cubitalis. Folia opposita, lanceolata, crassa, solida, virentia.
Flores corymbosi. Sub corymbis stipulæ ovato-lanceolatæ, aristatæ.
Petala subrotunda, rubentia. ex Vitman in Summa Plant. 6. 1790
Sed hæc icon valde multiflora. sic Haller. in hist. helv. n.º 924.

LXXVI

ex Tab. 42



Linum sylvestre minus, flore cæsio, folio verticillato.
Linum - verticillatum Linnæi Classe V.
In Italia ☉

LXXVII ex Tab. 42.



Mūscus marinus, crispus virens, et gilvo luteus.

LXXVIII ex Tab. 43.



Tragoriganum, Dyctamni capite, hispanicum. est
Thymus-cephalotus Linnæi, Classe XIV.
:: Thymus capitulis magnis, imbricatis: bracteis ovatis: foliis lanceolatis. Syst. Veg. ed. 14
In Hispania, Lusitania. ♄.



Centaurium minus leptophyllum polyanthes accenso acutoque flore.
Gentiana-Linariaefolia Lamarck.
Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, stylo longo simplici foliis linearibus subuninerviis.
Europae australis incola.

LXXX ex Tab. 43.



Lychnis corniculata minor, seu angustifolia saxatilis. est
Velezia-vigida Linnæi, Classe V. Syst. Veg. ed. 14.

Caules sesquipalmares, ramosissimi duri. Folia connata, subulata, integerrima, pilosa. Flores axillares solitarii, sessiles. Corollæ limbus minimus ad basin notatus lunula purpurea ut in Caryophyllæis. Stamina quandoque sex. ex Vitman in Summ. Plant. 1789.

Per Europam australem. ☉



LXXXI ex Tab. 44



Tithymalus dulcis, tuberosa radice, Italicus. est vel Euphorbia-dulcis Linnæi. Classe XI, sed floribus non sessilibus. Haller hist. helv. n.o 1051



Androsæmum montanum minus.



LXXXIII

ex Tab. 44



Thlaspi minimum tomentosum, angusto Leucoy folio, floribus luteis.

LXXXIV Tab. 45.



A. Clinopodium minus, Pulegii odore, romanum

BBB Clinopodium perenne, Pulegii odore. est Thimus-patavinus Jacquini obs. botan. vol. 4. pag. 7. tab. 87.

C Clinopodium montanum Casp. Bauh. est Thymus-alpinus Linnæi; Classe XIV.





Nasturtium alpinum Resedae folio. est
Cardamine-Resedifolia Linn. Cl. XV.
Cardam. foliis inferioribus indivisis; superio-
-ribus trilobatis ternatisque.
Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Helvetiae. ♂!

Polypodium minus acutioribus foliis Cordubense.
Pteris- ensifolia ex Linn. System. Cl. XXIV
Pteris foliis pinnatis foliolis longissimis sessilibus basi
sursum excisis (infimis longioribus) Desfontaines. Flor. atlant.
affinis Pteridi longifoliae
Incola Hispaniae et ad rivulos prope Juliam caesa
ream in Barbaria videlicet Mauritania

LXXXVI

ex Tab. 36



Scabiosa montana, repens, Valerianæ æstivæ folio, longius radicata, floribus dilute rubris, odoris.



LXXXVII

ex Tab. 47.



Polypodium majus acuto folio Viterbiense.
Polypodium - vulgare Linn. Var. B.



Linum sylvestre fruticans tricho-
-des, Thymi folio polyantes.



LXXXVIII ex Tab. 47.



Rubiola montana. quæ

Arenaria tetraquetra Linn. Cl. X. var. B.

Ar. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis Sp. plant.

♃ In territ.o Monspelliensi ... pag. 605.

LXXXIX

ex Tab. 48



Ononis non spinosa, rotundifolia spicata purpurea, hispanica.



Iacea intybacea, capite rubro spinoso. est
Centaurea-nudicaulis Linnæi. Classe XIX. etiam in fol. CCLIII.
Cent. calycibus setaceo-spinosis: foliis indivisis, superioribus subdentatis. cauli simplici, subnudo, unifloro. Syst. Veg. ed. 14.
Planta adhuc in propria specie obscura, quum Botanicorum icones non consentiant. Consu-lendum esset Linnæi herbarium a Cl. Smithio Londini possessum. Ideo vid. icon. Scopolianam ex tab. 139.

XCI ex Tab. 49



Iacobæa Linifolio Hispanica, et Italica.

Senecio - Linifolius. Linnæi Cl. XIX.

Sen. corollis radiantibus: foliis linearibus, integerrimis; corymbo subsquammato: caule herbaceo. Syst. Veg. ed. 14. = Italiæ, Hispaniæ &c. indigena.

Caulis bi-tripedalis. Pedunculi squamis minutis, acutis adspersi. Calyx haud sphacelatus. Corollæ radius octiflorus. Vitman.

XCII ex Tab. 49



Iacobæa montana integro rotundo folio.
Cineraria- alpina Linn. Cl. XIX.
ex Gilibert.
Cin. umbella involucrata pedunculo communi nudiusculo foliis oblungis villosis.
Jacobæa alpina foliis subrotundis serratis Bauh. Pin. 131. propr. 70. t. 71.

Iacobæa montana Betonicæ folio. est
Cineraria-longifolia Linnæi Class. XIX
Ciner. foliis obsolete denticulatis, omnibus oblongis.
Syst. Veg. ed. 14.
In Austria &c. 2.
Senecio Barellieri ex Sovanio

XCIII ex Tab. 50.



Filix florida minor hispanica.

XCIV

ex Tab. 50.



Arisarum minus proboscideum. est
Arum-proboscideum Linn. Classe XX.
Arum acaule: foliis hastatis: spatha decli-
-nata, filiformi-subulata. Syst. Veg. ed. 14.
In Appenninis indigena.



Marum Thymifolium incanum spica-
-tum, crenato folio, Pulegii odore, hispan.



Solanum vescicarium minimum bacca lutea.

Physalis indica. Lamarck.

Physalis ramosa glabra, foliis ovato-lanceolatis integris laevibus, calycibus fructescentibus acutangulis

Melampyrum minus purpureum Trissaginis folio.

XCVI ex Tab. 51.



Trifolium acetosum Americanum, rubro flore.

Oxalis – Barellieri Linn.

Oxalis caule fruticoso, foliis ternatis, foliolis ovatis, terminali pedicellato, pedunculis apice dichotomis racemiferis.

Americæ meridionalis incola.



Dipsacus giganteus tetraphyllus et triphyllus.

XCVIII ex Tab. 52



Chamæstœchas hispanica.

XCIX ex Tab. 53




Hieraceum montanum Malicotoneæ folio.

Hieracium- cotoneifolium Hort. reg. parisiens.

Hierac. caule folioso hirsuto ~~caule~~ apice paniculato, foliis ovatis subdentatis hirsutis: superioribus amplexicaulibus. Lamarck

An Hieracium caule &c. Haller Helv. No 43. Alpium Delphinatus et Germaniæ Incola.

C ex Tab. 53.



Chamarhododendros ferruginea, supina, Thymi folio, alpina; est
Azalea-procumbens Linnæi, Classe V.
Azal. ramis diffuso-procumbentibus: Syst. Veg. ed. 14.
Caulis semipedalis et ultra, ramosissimus, lignosus, fuscus. Folia Thymi, opposita subses-
-silia, ovato-lanceolata convexa, dura, nervo eminente sordide viventia, subtus ferrugi-
-nea. Flores terni-quaterni, amœni, solitarii ex summis alis, et breviter pedunculati. Calyx
purpurascens. Corolla carnea. Vitman.
In Alpibus Europæ.



CI ex Tab. 34



Lychnis maritima pinguis ex Corsica. est
Silene-vallesia Linnæi, Classe X.
Silene caulibus decumbentibus, subunifloris, foliis lanceolato-tomentosis longitudine calycis.
Syst. Veg. ed. 14.
In alpibus Vallesiacis &c. ♃.
Flores grandes, erecti. Petala bifida basi limbi subauriculata, intus
alba, subrosea, extus fœnicea, noctu odora. &c. ex Vitman.



Hieracium montanum, Iaceæ integro-
-folio.



Iacea hispanica latifolia, nervis foliorum
lanuginosis.

Serratula - pinnatifida Willdenow.

Ser. fol. petiolat. oblong. pinnatifid dentat, lanatis. calyce cylindrico, terminali, squamis adpressis, oblung. cartilagineo-mucronatis, mucronibus patulis. ⊙ In Hispania





a a *Centaurium alpinum glabro, angusto, Bistortæ folio.*

6. *Gramen supinum, brevi, hirsuto folio, paniculis echinatis singularibus.* est Linnæi Classe III

Panicum-hirtellum. spica composita; spiculis adpressis alternis, calycibus geminis. valvulis omnibus aristatis, extima lon[illegible] Syst. Veg. Ed. 14.

Panicum-Burmanni ex Retz. observationibus

CIV Tab. 56



Sideritis montana, Lamii folio rugoso.

CV ve Tab. 57



Gramen supinum minimum chamædrioides.

CVI

ex Tab. 57




B. Gramen pusillum:
:unicaule, panicula Loliacea. est
Triticum-unilaterale Linn. Cl. III.
T. calycibus unilateralibus alternis muticis.
Syst. Veg. ed. 14.

C. Gramen exile arundinaceum mi-
-nimum, acumine reflexo. est
Nardus-aristata Linnæi, Classe III.
Nard. calycibus aristatis. Syst. Veg. ed. 14.

A. Gramen pomorum et Meliloti redolens. est
Anthoxanthum-odoratum Linnæi, Classe II.
ex fide Monti, ac Halleri.

D. Gramen erectum, unica spica avenacea.

CVII ex Tab. 58



Polygonum majus, flagellis donatum.



A. Pseudo-Stachys, Menthæ-cattariæ folio.


B. Trachelium oblongo folio, Alpinum. est Campanulæ glomeratæ varietas β Linnæi classe V.



Gramen Myuros erectum minimum
arundinaceum. est
Ægilops-incurvata Linnæi, Classe XXIII. ex edit. S.P. 13.
et
Rottboëlla-incurvata Linn. Cl. III. ex edit. 14.

R. spica tereti, subulata; gluma calycina
subulata, adpressa, bipartita. ex Linn. supp.
In Europæ maritimis. ☉

Rutha montana spinosa alba.





Gramen omnium minimum
loculis Lunariæ græcæ.

Gramen capsulis Lunariæ græcæ dona
tum, articulatum minimum a tenu-
issimo pediculo pendentibus, uno ver-
su dispositis, Bononiense.

Gramen cyrrosis, et villosis spongiolis ad singula genicula-
-donatum. est

Poa nemoralis varietas. Linnæi Classe III.

Poa panicula attenuata; spiculis subbifloris mucronatis,
scabris; culmo incurvo. frasis veræ. Syst. Veg. ed. 14.

CXI ex Tab. 60.



Scrophularia capsula turgida. est
Scrophularia-trifoliata Linnæi.
classe XIV.
Scrophul. foliis glabris; inferioribus ternato-pinnatis obtusis: superioribus simplicibus: pedunculis axillaribus, subtrifloris. Syst. Veg. ed. 14.
In Africa, Corsica. ♂

CXII ex Tab. 60



Euphrasia tenuissime dissecto folio, angusto.

Euphrasia minima lutea.

CXIII

esc Tab. 61.



Nepeta angustifol. minor, Hispaniæ et Italiæ.



Rapunculus Teucrii folio rhomboidali. est
Campanula-rhomboidea Linnæi Classe V.
Camp. foliis rhomboidibus serratis, spica secunda,
calycibus dentatis. Syst. Veg. ed. 14.
Habitat in alpibus Italiæ, Helvetiæ. ♃.
Campanula caule levi, simplici, foliis glabris, ovato-
-lanceolatis, serratis, petiolis paucifloris.
Haller hist. helv. no. 693.
Iter II. no. 30. ejusd.

Polium saxatile, Chamædriodes ampla coma. est
Teucrium-pyrenaicum Linnæi, Classe XIV.
Teucr. foliis cuneiformi-orbiculatis, crenatis, pilosis:
corymbo terminali. Syst. Veg. ed. 14.
ex fide Linneana sed melius convenit:
Teucr. saxatili Lamarck.
Teucrium foliis ovato-rhomboidibus crenatis petiolatis sub-
-tus tomentoso incanis caulibus fruticulosis floribus subra-
cemosis. ♄. Hispaniæ crescit ex Jussieu

CXV



A. Lychnis rubra montana- Globulariæ capitulo. est

Saponaria lutea species β Linnæi Classe X.

Sapon. calycibus teretibus: corollis coronatis: floribus subumbellatis: foliis sublinearibus (non in hac varietate) canaliculatis. Syst. Veg. ed. 14. in Alpibus. 2

Saponaria- bellidifolia Smith. et Wildenaw Spec. plant. vol. 2. p. 670. n.° 9.

Corolla est lutea, et non rubra. Bocco se decepit.

B. Thlaspi Thymifolio, utriculo subrotundo mucronato, hispanicum. est

Alyssum- montanum Linnæi Cl. XV.^{2}

vid. tab. [illegible]. vera 67

CXVI ex Tab. 62.



Polium saxatile chamædrioides, rotundifolio, supinum, flore rubello.

CXVII ex Tab. 63



Euphrasia vermiculato folio, hispanica.
Euphrasia – longiflora Lamarck
Euphrasia foliis linearibus integerrimis corollarum tubo tenui calyce multoties longiore. In Hispania crescit.



A.
Convolvulus longifolius azureus, niveo umbilico erectus, Africanus.

B. *Centaurium montanum Neapolitanum, angustifolio.*

C. *Perfoliata humilis alpina*
(Bupleurum angulosum Linn. Sp.
B.

CXIX ex Tab. 64.





Trachelium saxatile Bellidis folio, coeruleo flore Creticum. est.

Campanula-saxatilis Linn. Class. V.

Camp. capsulis quinquecarinatis obtectis: foliis obovatis, crenatis: floribus alternis nutantibus. Syst. Veg. ed. 14.

Cistus humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis: est

Cistus-squamatus Linnaei, Classe XIII.

CXX

ex Tab. 64



Thlaspi montanum album, siliqua hastata, acuto Globulariæ folio.

CXXI ex Tab. 65.



Alyssum incanum erectum, siliqua utriculata. Iacea Stoechadis folio, flore luteo.

CXXII ex Tab. 65.



Papaver rhoeas integro folio, hispanicum.

CXXIIII   *vi Tab. 66.*



Chondrilla Cyanoides lutea Coronopi folio non diviso.
Catanance lutea Linn.
Catanance squamis calycinis interioribus lanceolatis. ⊙
Italiæ, Cretæ Insulæ &c. Incola.



CXXIV

ex Tab. 66



A. Leucojum minus purpureum angustifo-lio longiori.

B. Idem breviori folio, obsoleto flore.

CXXV ex Tab. 66.



Amaranthus minor, spica singulari, albopurpurea, luteaque, lunatis circum caulem foliis. est

Celosia- castrensis Linnæi, Classe V.

Celos. foliis lanceolato-ovatis, acuminatissimis, lineatis: stipulis falcatis: spicis cristatis. Syst. Veg. ed. 14.

In India. ☉.

CXXVI

ex Tab: 67



Hyssopus montana verticillata
minor, est
Sideritis-incana Linn. Cl. XIV.

Sider. suffruticosa, tomentosa: foliis
lanceolato-linearibus (plerumque
omnibus integerrimis) floribus
bracteisque dentatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispania. ♄.

Thlaspi luteo Leucoij flore. est
Alyssum-montanum Linnæi, Cl. XV.
Alyss. caulibus herbaceis diffusis: foliis obverse
lanceolatis punctato-echinatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Helvetiæ, Germaniæ, Pedemontii apricis siccis. ♃.

CXXVII

oc Tab. 67



Aster Conyzoides, angustis Linariæ foliis.

CXXVIII ex Tab. 68.



Ionthlaspi seu Leucojum montanum luteum, subrotundo Thlaspi utriculo, Italicum.



Thlaspi fruticans, erectum, angus-tifolium, utriculis subrotundis.

CXXIX

ex Tab. 68.



Conyza marina, tuberosa, lutea.

CXXX ex Tab. 69



Arctium montanum angustifolium hispanicum.



CXXXI ex Tab. 69




Thlaspilinium erectum flore albo, turbinato utriculo, Italicum.



Marrubium album sericeo parvo et rotundo folio. est
Marrubium supinum Linn. Cl. XIV.
M. dentibus calycinis rectis, setaceis, villosis. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispania, Carniola &c.





Abrotanum fœmina tomentosum, crispum, incanum hispan.



Thlaspi flore albo, siliqua triangulari crenata.

CXXXIII ex Tab. 70



Convolvulus saxatilis erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpurasc. hisp.

Convolvulus- Cneorum Linnæi Classe V.

Conv. foliis lanceolatis, tomentosis: floribus umbellatis: calycibus hirsutis: caule erecto. Syst. Veget. edit. 14.

In Hispania, Creta, Syria &c. habitat.

CXXXIV ex Tab. 71.



Lychnis fruticosa angustifolia, minima, flore albo, hispanica. est
Silene - Saxifraga Linnæi, Classe X.

Silene caule subunifloro, pedunculis longitudine caulis, floribus hermaphro-
- ditis femineisque, petalis bifidis. Syst. Veg. ed. 14.
In montibus cretaceis. ♃.






Eryngium minimum, trifidum hispan. et italicum. est
Eryngii-amethystini varietas Linnæi Classe V.
Eryng. foliis radicalibus trifidis, basi subpinnatis. Syst. Veg. ed. 14.
hæc varietas minor est, et distincta foliolorum involucris trifidis. ex Witman. ideo
Eryngium-dilatatum salutatur a Lamarck sicuti species distincta.
in Lusitania, Hispania, et Africa crescit. Desfontaines.

CXXXVI

ex Tab. 71.



Absynthium pumilum, palmatum, minus, argenteo seviceoque folio, hispanicum, et italicum. est

Absynthium - Boccone Linnæi, Classe XIX.

Abs. foliis seviceis, radicalibus petiolatis, pinnatis, incisis; caulinis semi-pinnatis. ex Hallero helv. n. 127.

Genipí nigrum Incolis.

CXXXVII ex Tab. 72



Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo majori. est Geranium-pyrenaicum Linnæi, Classe XVI.

Geranium pedunculis bifloris: foliis inferioribus quinquepartitis multifidis, ro-tundatis; superioribus trilobis: caule erecto. Syst. Veg. ed. 14.

In Pyrenæis, Anglia Cl.. 4.

CXXXVIII ex Tab. 72



Brassica sylvestris, albido flore nutante siliqua . est
Arabis-Turrita Linnæi, Classe XV.
Arab. foliis amplexicaulibus: siliquis linearibus, recurvis, planis,; calycibus (sulcatis). Syst. Veg. ed. 14.
In Europæ sepibus montosis. ♂.

CXXXIX ex Tab. 72




Betonica montana lutea latifolia. est
Betonica-Alopecuros Linn. Cl. XIV.

Bet. spica basi foliosa, corollis galea bifida. Jacquin austr. t.73. Syst. Veg.
Habitat in montibus Sabaudicis, Silesiae, Austriae superioris, Lessanensibus,
Italicis, Galloprovinciae. ♃

CXL

ex Tab. 73



Fumaria henneaphyllos hispanica, saxatilis. est
Fumaria-enneaphylla Linnaei, Classe XVII.
Fumar. foliis triternatis: foliolis cordatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispaniae, Siciliae saxosis.



Kaly polygonoides, frutex, polyspermon.



Rutha sylvestris linifolio hispanica est
Ruta-Linifolia Linnæi, Classe X.
Ruta foliis lanceolatis, indivisis. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispania, et Media. ♃.



CXLII

cx Tab. 74



Chamæcistus luteus, toroso folio, hisp.

Abrotanum tenuifolium incanum, minimum.



CXLIII ex Tab. 74



Coris lutea ericoides fruticans hispanica.

Hypericum-Ericoides Linn. Cl. XVIII.

Hyp. fruticulosum glaucum, caulibus tortuose ramosis, foliis minimis verticillatis imbricatis subsessilibus. ♃.

Hyspaniæ, Lusitaniæ incola,



Rubia minor, quadrifolia, atrovirens, saxatilis.

CXLV

ex Tab. 75



Rubia lævis, linifolia, floribus albis; Montis Virginis Neapoli es.

Galium-aristatum Linnæi Classe IV.

Gal. foliis [sæpe] octonis, lanceolatis, læv[illegible]us: panicula capillari:
petalis aristatis: seminibus glabris. Syst. Veg. Ed. 14.
habitat etiam in Baldo &c.

Corolla purpurascens, apice seta alba; antheris [illegible].

Galium-linifolium Lamarck

CXLVI

ex Tab. 76




Iacea major Pineis foliis luteo flore ca-
-pite spinoso.

Centaurium minus luteum, angustifolis, non
perfoliatum. est
Gentiana-maritima Linnæi, Classe V.
Gent. corollis quinquefidis, infundibuliformibus; stylis geminis:
caule dichotomo paucifloro. Syst. Veg. ed. 14.
In Italiæ, Galliæ maritimis. ☉.



CXVII CXLVII

ex Tab. 76



Ferula durior, seu rigidis et brevissimis foliis. est
Bubon- rigidius Linnæi, Classe V.
Bubon foliolis linearibus. Syst. Veg. ed. 14.
In Sicilia. ♃.

CXLVIII

ex Tab. 77.



Anchusa angustis dentatis foliis. est

Anchusa-undulata Linnæi, Classe V.

Anch. strigosa; foliis linearibus, dentatis: pedicellis bractea minoribus, calycibus fructiferis inflatis. Syst. Veg. ed. 14.

In Hispaniæ, Lusitaniæ, Sibiriæ pratis habitat.

CXLIX

ex Tab. 77



Thapsia alpina lucida Thalictri, seu Carotæ folio, flore albo.

CL ex Tab. 78



Anchusa angustis, villosis foliis.

CLI

ex Tab. 78



Lycopsis spatulæ foliis hispanica, et sicula.

Lycopsis angustifolia minor.

Echium - maritimum Willdenow.
Planta albo-pilosa. Folia caulina breviora linea-
ri-lanceolata, obtusiuscula. Caulis 4-5 uncialis
hispido-villosus. Flores magni coerulei. Corolla
irregularis. Stamina corolla breviora
In maritimis Italiæ, Siciliæ &c. plant. annua.

CLII

ex Tab. 79



Thalictrum Batrachioides minus, flore albo, Italicum. &c.
Isopyrum-Thalictroides Linnæi, Classe XIII.
Isopyrum stipulis ovatis: petalis obtusis. Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Italicis &c.



Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo. est
Allium-senescens Linnæi, Classe VI.

Allium scapo nudo, ancipiti: foliis linearibus subtus convexis lævibus: umbella subrotunda; staminibus subulatis. Syst. Veget. ed. 14. In Sibiria, Helvetia &c. ♃.

CLIV Tab. 80



Erucula hirsuta, floribus albis

Blittum angustifolium, verticillatum.



CLV

ex Tab. 80.



Saxifraga rotundifolia, flore albo, annua, Italica.



Erucula flore rubello, hispanica
Sisymbrium valentinum Linnæi
Classe XV.

Sisymb. caule simplici, erecto, superne
glabro: foliis lanceolatis an-
-trorsum dentatis hispidis.
Syst. Veg. ed. 14. vide
meliorem Iconem in Museo 2.

CLVI

ex Tab. 81.



Fumaria exilis romana



CLVII

ex Tab. 81.





Lycium indicum foliis Ericæ.

Iacobæa erecta angustifoliis dentatis Sabauda.





Geranium Cicutæ folio romanum
Geranium-chærophyllum. Cavanilles.
Ger. caule erecto decumbente: foliis oppositis, pinnatis, incisis. pedunculis elongatis multifloris, cotyledonibus trilobis. Cavan. Part. 22. n. 319. Tab. 95. fig. 1.




CLIX


ex Tab. 83



Persicaria altera Lepidii Pauli foliis. est Polygonum-divaricatum Linnæi Classe VIII.
Polyg. floribus octandris, trigynis racemosis: foliis lanceolatis; caule divaricato, patulo. Syst. Veg. ed. 14. 2. est

Tragorigonum Apulum. Polygonum-alpinum Willdenow.





Geranium Chrysantemi Cretici folio.
Geranium-Ciconium Linn.
Ger. caule herbaceo reclinato: foliis pinnatis pinnulis incisis, petalis duobus superioribus latioribus
Cavannilles. Part. 22. n.° 322. Tab. 95. fig. 2.
Hispan. Gall. Italia crescit. ⊙

Nasturtium montanum Bursæ Pastoris folio, loculis angustissimis.



B. Glawc altera subrotundo
folio. quæ est
Peplis-portula Linnæi Classe VI.
Peplis floribus apetalis: Syst. Veg. ed. 14.
In Europæ inundatis. ☉

A. Glawc major palustris flore herbaceo. est
Isnardia-palustris Linnæi, Classe IV. Syst. Veg. ed. 14. 2.
In Italia, Gallia, America &c. ad Lacus, et fossas.

CLXII ex Tab. 85.





Gnaphalium-supinum. est sic
et vocatum a Linnæo in Classe XIX.
Gnaphalium caule herbaceo, procumbente,
simplici. floribus sparsis.
Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Helveticis, Italicis ♃.

Ptarmica alpina



CLXIII ex Tab. 85



Digitalis Verbascifolia. est
Digitalis-Thapsi Linnæi Classe XIV.
Digitalis foliis decurrentibus. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispania &c. 4.

CLXIV ex Tab. 86.




Cotyledon pyramidale polyanthos. est
Saxifragæ Cotyledon Varietas, ε Linnæi Classe X.
Saxifraga foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo serratis, caule paniculato. Syst. Veg. ed. 14. = In Alpibus Europæis. ♃.
Saxifr. foliorum ora cartilaginea: caule triplicato-ramoso: petalis immaculatis. Hall. helv. 977.
Saxifraga-aizoon Jaquin. et Murray.

CLXV

ex Tab. 86





Gallium villosum Boc. et Lamarck
Galium foliis octonis lineari-lanceolatis villosis reflexis, floribus racemoso-spicatis, pedunculis divisis brevissimis villoso-hirtis.

Pulmonaria alpina angusto folio. est
Pulmonaria - angustifolia Linnæi, Classe V.
Pulmonaria foliis radicalibus lanceolatis. Syst. Veg. ed. 14
In Helvetia, Pannonia, Italia, Germania, Suecia. 2.

CLXVI ex Tab. 87.



Serpentaria minor Arisari angustifolii foliis.




CLXVII
ex Tab. 87
Asplenium lucidum Melitense
Gramen lanceolatum Siculum
Milium nodosa radice.

CLXVIII

ex Tab. 88.





Pistolochia minima incana.

Barbarea montana integro folio. est
Cardamine-Bellidifolia Linn. Cl. XV
Card. foliis simplicibus ovatis, petiolis longissimis. Emend. III.
in Alpibus Lapponiae, Helvetiae, Britanniae ♃



CLXIX

ex Tab. 88



Tithymalus

Tithymalus arboreus tuberosa radice.



CLXX

ex Tab. 89



Clinopodium nigricantibus foliis Siculum.

Geranium Malacoides crasso, rugoso integro folio.
Gerranium – crassifolium. Cavanilles.
Ger. caule humifuso; foliis cordatis, subrotundis, rugosis, crassis: floribus umbellatis parvis. Cav. Part. 22. n.º 306. tab. 90. fig. 1. In montibus Siciliæ




CLXXI

ex Tab. 89



Hippophestum Cæsalpini sive
Glastivida secunda cretica Ponæ.



Serpillum saxatile nanum. est
Thymus foliis ellipticis hirsutis: ex Hallero hist. helv. n: 236
et. Serpillum Pannonicum III. Clusii hist. rar. 360: sic idem Hall.
~~sic in hac Icone folia non hirsuta apparent.~~





Eruca hirsuta Bellidis sinuato folio.




CLXXIII
ex Tab. 91
Androsemum
Numulariæ folio. est
Androsemum-Nummula- riam Lin.Cl.XVII.
Hypericum-Numularium
Linnæi Classe XVIII.
H. floribus tryginis. calycibus ser-
-rato-glandulosis: foliis corda-
-to-orbiculatis. glabris.
Syst. Veg. ed. 14.
In Pyrenæis &c. 2.
Gramen paniculatum odoratum.

CLXXIV Tab. 91.



Hypericum Myrthi acuto folio, siculum.

Hyppiricum - linarifolium. Hyp. caule fruticuloso ancipiti. foliis lanceola-
- to-linearibus, obtusis. semiamplexicaulibus. bracteis ciliato-glandu-
4 losis. Encyclop. methodiq. n.° 75. Habitat Hispaniæ et Lusitaniæ &c.

CLXXV ex Tab. 92





CLXXVI

ex Tab. 92



Muscus odoratissimus.



Muscus saxatilis incanus.

Been album Fabariæ foliis. est

B Cucubalus-fabarius Linn. Classe X.

C. foliis obovatis carnosis. Syst. Veg. ed. 14.

In Sicilia.



Alsine orbiculatis foliolis.

Thlaspi ~~incanum~~ luteum Leucoj folio. est
Alyssum-saxatile Linnæi Classe XV.
A. caulibus frutescentibus paniculatis. foliis lanceolatis
mollissimis repandis. Syst. Veg. ed. 14.
In Creta, Austria ♄.



CLXXVIII ex Tab. 93



Pistacium mas. est
Pistacia- trifolia Linn, Classe XXII.
P. foliis subternatis, simplicibusque. Syst. Veg. ed. 14.
In Sicilia ♄.



CLXXIX

Tab. 94



Tee Sinensium, sive Tsia Japonica



CLXXX



Iacea intybacea capite rubro spinosa.

Vid. icon. tab. 48. et 133.



CLXXXI ex Tab. 95



Anthillis Lentifolio Scorpioides.



Gramen maritimum paniculis asperis Loliaceis. est


Triticum-maritimum **L**inn. Cl. III.

Trit. spica ramosa; calycibus sexfloris, flosculis secundis apice aristatis.

In Galliæ, Angliæ maritimis.



CLXXXII ex Tab. 95.



Muscus arboreus Coralloides auriculatus.



Pulmonaria viridis non maculata subrotunda.



Clinopodium alpinum roseum Saturejæ folio.



CLXXXIII

Tab. 96





CLXXXIV ex Tab. 96




Spiræa Hyperici folio.



Spiræa altera floribus expansis.



Convolvulus rectus villosus argenteus.
Convolvulus saxatilis ~~W~~ Willden.
Convolvulus lanuginosus Lamarck Enc.
Lychnidis Dalechamp. hist. 817.
Habitat in Italia, Hispania &c.



CLXXXV

ex Tab. 97



Atractylis pyramidalis foliolis crispis.

CLXXXVI ex Tab. 97



Atractylis multicaulis Cornuco-
-pioides.



Spartium setulis tenuissimis.
Stipa tortilis Desfontaines.



CLXXXVII

ex Tab. 98



Bellis incana Chrisanthemi cretici folio. *est*
Anthemis - *montana* Linnæi, *Classe* XIX.
Anth. foliis pinnatis, pinnis planis integerrimis pin-
-natifidisque; pedunculis longis, erectis,
unifloris. Govann. Illustrat.
In Italia &c.

Digitalis *angustifolio his-*
-panica. *est*
Digitalis - *obscura* Linn. *Cl.* XIV.
D. *foliis lineari-lanceolatis, integerrimis*
glabris, basi adnatis. Syst. Veg. ed. 14
In Hispania. ♄.



CLXXXVIII

ex Tab. 98



Marrubiastrum Cardiacæ folio. est
Leonurus-Marrubiastrum Linn. Cl. XIV.
L. foliis ovatis, lanceolatisque serratis: calycibus sessilibus, spinosis. Syst. Veg. ed. 14.
In Europa ad muros, vias, et fossas. ♃.

Thlaspi Hierico sylvestri affine. est
Anastatica-Syriaca Linn. Cl. XV.
A. foliis acutis: spicis folio longioribus: siliquis ovatis rostratis. Syst. Veg. ed. 14. ☉



CLXXXIX

ex Tab. 99





Polygala brevi lanceolato-folio.

Panax heracleum tenuius incisis foliis. est Heracleum- elegans Linnæi Classe V.
In Austria, Pedemontio. ♃.

CXC

ex Tab. 99



Panax alpina Ebuli laciniatis foliis. *est*
Angelica-*Razulii* Linn. Class. V.
Ang. foliis bipinnatis, foliolis lanceolato serratis, decurrentibus. Gouan. Illustr. tab. 6.
In Pedemontii pratis. ♃.




CXCI ex Tab. 100



Halimus Nummulariæ madido folio.

Iacobæa humilis Senecionis folio.



CXCII

oc Tab. 100



Halimus supinus Polygoni folio.




CXCIII

a Tab. 101.



Centaurium angustifolium Neapolitanum.



Ptarmica Millefolii foliis alpina. est
Achillea- alpina. Linnæi Classe XIX.
Achillea foliis lanceolatis, semipinnatis pinnulis minutissime serratis. ac ex editione 14 S. Veg.
est —— foliis lanceolatis dentato serratis; denticulis tenuissime serratis. melius.
In Alpibus Helvetiæ, Sibiriæ &c. ♃.



CXCIV

ex Tab. 101



A. Gentianella Bellidis folio.

Rubeola saxatilis alpina est
Galium-Boccone Linnæi, Classe IV.
Galium caule angulOSO; foliis senis subasperis aristatis.
Syst. Veg. ed. Haller helv. n°. 715.
In alpium apricis saxosis. ♃



CXCV

ex Tab. 102



Lingua cervina polyphylla polyschides.

CXCVI

ex Tab. 102.



1. Fumaria fœniculi-tortuosi folio Romana.

3. Eruca parva Iberidis folio sicula.

2. Veronica minima Clinopodii-minoris folio glabra romana, est Veronica-acinifolia Linn. Cl. II.
Veronica floribus solitariis pedunculatis: foliis ovatis crenatis glabris caule erecto subpiloso. Syst. Veg. ed. 14. ☉. In Europa australi.

Cyanus montanus, caule folioso, capitulo oblongo.

Cresce questa pianta alta un piede, produce i fiori purpurei, il caule stipato di foglie, e queste sinuate. Trovasi nella montagne vicine a Vall'ombrosa, ed all'Avernia in Toscana. Bocc. Decad. 1. p. 20.

Linnaei est

Centaurea calyce recurvato-plumoso, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis.

Cyanus foliis lanceolatis tomentosis, calycinis plumulis reflexis. Haller. helv. n: 189. secund. Reichard.

Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis decurrentibus caule simplicissimo.

Cyanus caule unifloro, alato, foliis ellipticis lanceolatis. Haller. helv. n. 170.



CXCVII

ex Tab. 103



Sideritis glabra montana.




Campanula alpina caule folioso. est
Campanulæ-rotundifoliæ Varietas γ Lin. Cl. V.



CXCVIII

ex Tab. 103.



Limonium flagellis fœniculaceis.

Limonium flagellis tortuosis.



CXCIX ex Tab. 104



Fungus caule nigro. est
Agaricus-androsaceus Linn. Cl. XXIV.
Agar. stipitatus albus pileo plicato mem-
-branaceo, stipite nigro. Syst. Veg. ed. 13.
Amanita &c. Haller hist. helv. N.° 2351.
hab. in foliis dejectis Pini.

Muscus labellis croceis.
muscus-coccineus Linn.
secund. Haller.

Helichrysum saxatile. est
Conyza-saxatilis Linn. Classe XIX.
Conyza foliis linearibus subdentatis: pedunculis lungissimis
unifloris, caule suffruticoso. Syst. Veg. ed. 14. In Italia, Palestina &c. ♄.



2. Trifolium nodiflorum.

1. **Lapatum** *aquaticum Luteolæ folio. est*
Rumex-maritimus Linnæi, Classe VI.
Rumex *floribus hermaphroditis valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. Syst. Veg. ed. 14.*
In Europæ littoribus maritimis. ♃.



Chamæleon alpinus Sonchi spinosi folio.



CCII

ex Tab. 105



Pulmonaria Fragariæ odore.



CCIII

ex Tab. 106



Taraxacon saxatile . est
Hyoseris-taraxacoides Linn. Clas. XIX .
H. foliis sinuato-dentatis: seminum centralium pappis plumosis, pilis foliorum furcatis; radice fibrosa . Syst. Veg.
Vill. prosp. tab. 26. f. 3 .
In rupibus



Hieracium Bursæ Pastoris folio . est
Crepis-bursifolia Linnæi Classe XIX . vide etiam in tab. 112
Crepis foliis pinnatifidis crenatis: scapo nudo paucifloro.
Syst. Veg. ed. 14 .
In Sicilia &C. 2 .

CCIV ex Tab. 106



Hieracium-tomentosum integro folio.



Hieracium Tragopogoni foliis. est
Hyoseris-scabra Linnæi Classe XIX.
Hyos. scapis unifloris: foliis scabris: seminibus papposis. Syst. Veg. ed. 14.
In Sicilia, Pedemontio. ☉



Hieracium Asphodeli foliis. est
Hieracium-Porrifolium Linn. Classe XIX.
Hieracium caule ramoso, folioso: foliis lanceolato-linearibus, subintegerimis. Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Italiæ, Austriæ &c. ♃.





Muscus corniculatus fistulosus.
Lichen- cornutus Linn.



Echium Scorpioides alpinum tomentosum, nanum, supinum. est
Myosotis- pauciflora Linn. Cl. V.
Scorpiurus &c. Haller. hist. helv. 592.
Myosotis- nana. villars plant. delphi natus vol. 11. p. 459. tab. 13.



Bellis maritima minima Roris solis folio Cyrnæa. est
Bellium- Bellidioides Linnæi, Classe XIX.
Bellium scapis nudis, filiformibus. Syst. Veg. ed. 14.
In Italiæ locis aridis, primo vere; in Insulæ Balearicæ herbidis maritimis copiose. ⊙



CCVI ex Tab. 107.



aa... Fungus disco punctato. est
Peziza-punctata Lin. Cl. XXIV.
Peziza turbinata truncata, disco punctato Syst. Veg. ed. 14.
Sphaeria &c. Haller helv. n.° 2184.
Habitat in stercore equino nec alibi. puncta atra e seminibus immersis.

66... Muscus cornucopioides cristatus.

c. Polytricum aureum acaule.



CCVII

ex Tab. 108



Tymy-virginiay Linn.

nunc.
Brachystemum - virginicum. Michaux in Fl. Americ. septentrion.

C. Anagallis Polygoni folio.

A. Serpentaria Virginiana.
vid. aliam Icon. tab. 115.

B. Lysimachia Prunellæ foliis. an
Epilobium alpinum Linn. Cl. VIII.? et Epilobium - anagallidifolium Lamarck
Epil. foliis oppositis ovato-lanceolatis subintegerrimis
siliquis sessilibus: caule repente. Syst. Veg. ed. 14. In Alp. Helveticis &c. 4.



CCVIII

ex Tab. 108



Euphrasia lignosa, præalta, amplo Linariæ folio.

Ramus Euphrasiæ fructiferus





Muscus cupressinus.



CCIX

ex Tab. 109



Heliochryso siluestri similis
tota viridis.



Phyllum foeminificum
Alaterni brevi, glabro folio



Geranium Botrys folio.
Geranium-Botrys Linn.
Ger. caule supino: foliis cordatis oblongis sinuato-
-pinnatifidis hirsutis fructibus longis, erectis.
Cavanilles. Part. 22. n.° 304. Tab. 90. fig. 2.
In terris sabulosis et maritimis Hispaniæ,
Lusitaniæ, et Neapoli crescit. ☉



Iacea incana Chamæleonis capitulo.
Serratula-humilis Wilden. Spec. Pl. Vol. 3.
pag. 1639. n.° 4
Ser. fol. pinnatifid. lacin. linearibus integerrimis
subtus tomentosis. caule unifloro; calycib. cano-
tomentosis, lævis.
Habit. in monte Atlas circa Tlemsen.



CCX.

ex Tab. 109



Sideritis incana Oleæ folio. est
Stachys-palæstina Linn. Cl. XIV.
St. floribus subspicatis: foliis lanceolatis tomen-
-tosis, sessilibus integerrimis rugosis: calycibus
muticis. Syst. Veg. ed. 14.
In Palestina. b.
Vid. aliam Icon. in tab. 112.



Ancusa cretica mitior.



CCXI

ex Tab. 110





Fungus turbinatus. est
Lichen-ericetorum Lin. Cl. XXIV.
L. leprosus candidus, tuberculis incarnatis.
In Europæ sylvis sterilissimis glareosis, subnudis uliginosis.

Kali lignosum flore = musceso Rosmarini folio. est
Galenia-Africana Linn. Cl. VIII.
Gal. erecta fruticosa, foliis linearibus carnosis. Lin. Fil. Suppl. 227.

Scorpioides Galegæ foliis.



CCXII

ex Tab. 110.



Anthemis Sophiæ foliis. est



Ptarmica Matricariæ foliis. est
Achillea-macrophylla Linnæi Classe XIX.
Achillea foliis pinnatis, pinnis inciso-serratis; extremis confluentibus majoribus. Syst. Veg. ed. 14. = In Alpibus Italiæ, Helvetiæ. ♃.



CCXIII

ex Tab. III.



Leucojum montanum crucigerum Coronopi folio est
Cheiranthus tristis Linn. Var. B. et Var. A.
vid. in folio sequenti.
Hesperis angustifolia Lamarck. Var. B.

a. folia radicalia.
b. Planta sine eisdem.
c. flos naturalis
d. fructificatio matura.



CCXIV

ex Tab. III



Leucojum minus fruticans purpureum montanum crucigerum.
Cheiranthus-tristis Lam. [illegible]

Leucojum minus Lavendulæ folio, obsoleto flore angustifolio. est
Cheirantus-tristis Lin. Cl. XV. var. A.
Ch. foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus: petalis undatis caule fruticoso. Syst. Veg. ed. 14
In Hispania, Italia &c. ♄.
Hesperis-angustifolia
Lamarck

Leucojum minus angustifolium luteum.
Erysimum-Hieracifolium Lin.
Cheirantus-hieracifolius Lamarck
Cheir. foliis lineari-lanceolatis, dentatis complicato-canaliculatis asperiusculis siliquis longis subverticalibus ♂ Incola Italiæ Germ. Galliæ



CCXV

ex Tab. 112



Achillæa Sideritis ad caulem baccifera.

Bugula hungarica glabra.

Sideritis incana Oleæ folio. est Vid. Linnæi nom. in̄ tab. 109.



CCXVI

ex Tab. 112



Hieracium Bursæ Pastoris foliis.



Anchusa Cretica mitior.



CCXVII Tab. 113



Hieracium montanum Endiviæ folio. est
Hipochæris-pontana Linnæi Classe XIX.
Hip. caule simplici fol. unifloro foliis lanceolatis dentatis. ex H. Delphin.
et est Hip. helvetica ex Syst. veg. ed. 14.





Pseudo-Dictamnum seu Marrubium nigrum siculum
Galeopsidi Anguillaræ respondens,

Marrubium Pseudo-Dictamnus Linn. Cl. XIV.
M. calycum limbis planis villosis, fol. cordatis concavis, caule fruticoso. S. Veg.
planta tota tomento denso compacto vestita. habitat in Creta &c.

CCXIX

ex Tab. 115



Mentha cattaria rhomboidali folio.



CCXX


ex Tab. 115



1814
nunc est. Brachystemum-virginicum. Michau
in flora America-septentrionali.

Serpentaria Virginiana. est
Thymus-Virginicus Linnæi Classe XIV. (*)
Thymus capitulis terminalibus: caule erecto: foliis lanceolato-linearibus.
Systema Vegetab. edit. 14. Vid. al. icon. tab. 108.
In Virginia ♄.

(*) Non est Serpentaria Virginiana officinarum nam illa est Aristolochia-
-Serpentaria Linnæi. Vid. Catesb. car. 1. tab. 29, item Plukenetius alm. =
= tab. 148. fig. 5. item Morison. hist. 3. sect. 12. tab. 17. fig. 14.





Bellis foliolis ad caulem adnatis.

Nasturtium rotundo Thalictri folio
Cardamine-græca Linn.
Card. foliis pinnatis, foliolis inciso-lobatis subpalmatis obtusis petiolatis, siliquis ensiformibus. ☉
Siciliæ, Corsicæ, et Greciæ Insularum Incola.

CCXXII — ec Tab. 116



Gallium villosum supinum retuso folio.

Gallium saxatile glauco folio. est
Gallium-glaucum Linnaei Classe IV.
Gall. foliis verticillato-linearibus senis septenis: pedunculis dichotomis caule levi. Syst. Veg. ed. 14.





Scrophularia Laserpitii foliis. est
Scrophularia-lucida Linn: Cl.XIV.

S. foliis inferioribus bipinnatis, subcarnosis, glaberrimis; racemis bipartitis. Syst. veg. ed. 14.

In Oriente, Creta, Neapoli, Piceno &c. ♃.




ex Tab. 117




Melissa sylvestris hirsuta major Italica . est

Melissa romana Linn. Cl. XIV.
not: hirsuties, rugositas color, odor &c. esse a Melissa officinarum speciem diversam satis convincunt: Gabrini in Piceni itineribus anno 1789.



Marum hispanicum nigrum. est
Thymus-piperella Linnæi, Class. XIV.


CCXXV
oc Tab. 118
Lychnis maritima su-
-pina Cepeæ foliis.
trygìnia
capsula
petalum.
semibifidum
Lychnis hirsuto crasso folio.
Lychnis erecta Veronicæ foliis. an
Cucubalus- mollissimus Lin. Cl. X 2.
C. petala semibifida, panicula dichotoma: caule foliisq.
holosericeis: radicalibus spatulatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Italiæ maritimis. 4.




CCXXVI ex Tab. 118



Virga aurea montana minor. *est*
Solidago - minuta Linnæi, *Classe* XIX.
Solid. caule simplicissimo foliis caulinis integerrimis pe-
-dunculis axillaribus unifloris. Syst. Veg. ed. 14.
In Pyrenæis BC.
Varietas Solidaginis- Virgaureæ in alpibus adnata.

CCXXVII

ex Tab. 119



Gentianella Pyrolæ folio.



Glaux Myrthi Tarentinæ folio. est
Andrachne - Telephioides Lin. Cl. 21.
Caules plantæ palm-pedales virentes glabri, ad basin subfusci. Fol. alterna, breviter petiolata, ovata glauca. Pedunc. axillar. superne incrassati petiolis longiores. Corolla alba. Capsula subrotunda.
In italia

CCXXVIII ex Tab. 119



Stæbe incana acutis foliorum lobis



Satureja saxatilis compactis foliis.



CCXXIX


Tab. 120



Millefolium tomentosum odoratum. est Achillea- nana Linnæi, Classe XIX.
Ach. foliis pinnatis dentatis hirsutissimis: floribus glomerato- umbellatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Helvetiæ, Vallesiæ &c. 2.



Lysimachia trifolia spicata.



Eruca hirsuta
Papaveris folio.
Brassica fol. dentato pinnatifid. caule hispido siliquis levibus Linnaei
et Haller. H. helv. 459.

Scabiosa alpina Hieracii folio. est
Scabiosa-parviflora Desfontaines Flor. atl. T. 1. p. 119
Scabiosa-sicula Cardiaca folio. Tourn. I. R. Herb. 465.
Scabiosa dichotoma Cyrilli Neap.

CC.XXXI

α Tab. 121



Conyza præalta odorata alato caule capitulis barbatis Baccari Monspelliensis æmulantibus. est

inula - Bifrons Linn

INULA - BIFRONS Linn.



CCXXXII ex Tab. 121



Contrayerva Gentianæ affinis.



CCXXXIII Tab. 122



Marrubium hispanicum rotundifolium album majus. est
Marrubium-hispanicum Linn. Cl. XIV.
M. calycum limbis patentibus, denticulis acutis. Syst. Veg. ed. 14.
In Hispania. ♃.





Thlaspi biscutellatum luteo Ancusæ folio . est

Biscutella - sempervirens Linn. Cl. XV.

Biscut. siliculis scabriusculis, foliis lanceolato tomentosis . Syst. Veg. ed. 14.

In Oriente et in Hispania ♄.



Kaly vermiculatum albo globoso flore . est

Gypsophila - struthium Lin. Cl. X.

G. foliis linearibus carnosis, axillaribus confertis, teretibus. Syst. Veg. ed. 14.

In Hispania . ♃.



CCXXXV

cjc Tab. 123



Libanotis tenuifolia foeniculi semine Italica.

Cicutaria bulbosa esculenta.



CCXXXVI ex Tab. 123



Libanotis Ferulæ folio et semine Italica



CCXXXVII vc Tab: 124



Ranunculus Tribuli aquatici folii̇s

Ranunculus radice tuberosa reticulata.



CCXXXVIII

ex Tab. 124



Tragoriganum brevi circin-
-nato folio.

Trifolium fructu racemoso. est
Melilotus-Sicula Linn. Cl. XVII.
In Sicilia

Bellis foliolis laciniatis
ad caulem adnatis.

CCXXXIX

ex Tab. 125.



Acetosa Ari rotundo folio. est
Rumicis-Acetosæ varietas d. Lin. Cl. VI.


Carlina cornucopioides.



CCXL ex Tab. 125



Linum Oxyphyllum polycaule. est
Lini-tenuifolii Varietas e Linnaei Cl. V



CCXLI

ex Tab. 126



Acetosa minor lobis multifidis. est
Rumex- multifidus Linnæi Classe VI.
Rumex floribus dioicis: foliis hastatis, auriculis hastatis. Syst. Veg. ed. 14.
In Alpibus Hetruriæ, Calabriæ, Orient. ♃.

Acetosa Fagopyri folio. est
Rumex- luxurians Linn. Clas. VI.
Rum. floribus dioicis: fol. cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis: valvulis exterioribus subulatis; interioribus orbiculatis. S.V. ed. 14.
In alpibus Bononiensibus. ♃.



Acetosa flagellis non ramosis.

Acetosa Malus Limoniæ foliis.

CCXLIII ex Tab. 127



Viola alpina Nummulariæ folio. est
Viola-palustris Linnæi Classe XIX.
V. acaulis, foliis reniformibus.
Syst. Veg. ed. 14.
In Europæ frigidioris paludibus montosis.
♃.



Hypericum amplo perfoliato
folio Tournef. p. 255.

Androsemum Sambac amplo perfoliato
folio
Hypericum-ciliatum N°. 61. Encyclop.
methodique



CCXLIV

ex Tab. 127



Sideritis Salviæ folio. est Stachys-maritima **Lin.** *Cl. XIV,*
St. foliis cordatis, obtusis, crenatis: bracteis oblongis integerrimis.
Syst. Veg. ed. 14.
In litoribus Maris adriatici &c.
2.

Trachelium Pulmonariæ folio.





Geranium minimum
Chamædryoides.

Geranium-Chamædryoides Lin.
et Cavanill. pcat. 22. n. 272 tab. 76.
Fig. 2.

Ger. acaule fol. radicalibus parvis or
biculatis cordatis crenato incisis;
scapis unifloris bracteatis.

Scop. Delic. Flor. p. 8. t. 3.

Crescit in monte St. Michaelis Insulæ
Corsicæ




Geranium crasso Batrachioides folio.

CCXLVI

ex Tab. 128



Caryophyllata alpina tenuifolia, est
Geum-reptans Linnæi Classe XXII.
*Geum foliis uniformibus incisis alternis minoribus: flagellis reptan-
-tibus*. Syst. Veget. ed. 14
In Helvetiæ montibus &c. 4.



Onobrychis flagellis longissimis



CCXLVIII

ex Tab. 129



Bugula Hungarica.



Aster supinus lignosus. est
Buphtalmum - maritimum Lin. Classe XIX.
Buph. calycibus obtuse foliosis, pedunculatis, foliis al-
-ternis, spathulatis; caule herbaceo. Syst. Veg. ed. 14.
ad maris mediterranei litora. 2.
melior. icon. habet Clusius hist. 2. pag. 13.



CCXLIX ex Tab. 130



Buglossum Scorpioides hirsutum flore cæruleo.



CCL

ex Tab. 130



Thlaspi Leucoj folio acuminato



Horminum nigrum Menthastri folio.



CCLI

Tab. 131.



Iacobæa spinosa
brevi Leucoj folio.





Pseudo-Dictamum nigro rotundo, crispo
folio. est
Marrubium-crispum Linnæi Classe XIV.
M. foliis cordatis subrotundis, crenato subdentatis caly-
-cibus decemdentatis, muticis. Syst. Veg. ed. 14.
In Italia, Hispania. 2.
vid. mel. Icon. in Libri titulo p. 1.

Fucus marinus arundinaceus dulcis.


Bocc. Mus. 2. ex t. 129.

CCLII

Tab. 132



Ginseng
sive
Ninzi radix
est
Panacis-quinquefolii Lin.
Radix



Chrysanthemum Cinerariæ folio.

Boc. Mus. 2. ext. 129.

CCLIII ex Tab. 133



Centaurea - nudicaulis. Scopoli Delic. Insubr. fasc. 3. tab. 11. an
Jacea Intybacea, capite rubro spinoso Boccone? Ved. tav. ~~seguente~~ 48
Centaurea - nudicaulis Linnæi Classe XIX.

Tabulæ explicatio:
a a. Tota planta.
b. Flosculus radii magnit.e natural.
c. Flosculus disci fertilis
d. Calyx natural. magnitud.
e e. Semen.
f. Thalamus, ex flore dimidiato, ut pilosus appareat.



CCLIV




Lecta in viridario
P.P. Barnabit. Maceratae
anno 1789, et a me
hic delineata sua quasi
magnitudine,

Campanula-Erinus. Linnaei Classe V.

Camp. caule dichotomo foliis sessilibus superioribus oppositis tri-dentatis. Syst. Veg. ed. 14.

In Italia Piceni, Hispania, Gal-Narbonensi. ☉. column. phytob. t. 28.

T. 134



Viola-calcarata Linn. Cl. XIX.

Viola alpina purpurea exiguis foliis. Casp. Bauh.
Haller. hist. t. 17.

Vid. variet. in tab. sequenti

CCLV T. 135



Viola-calcarata **Linnæi** Classe **XIX**.

Viola caule abbreviato, foliis subovatis, stipulis pinnatifidis, nectariis calyce longioribus. Syst. Veg. ed. 14.

In alpibus Helveticis, Pyrenæis &c. ♃.

Melanium montanum Dalech. hist. 1024.



Thea-Bohea Linn. Cl. XIII.

Thea calyce quinque-sexphyllo. Corolla sex, novem petaly. Capsula tricocca. Syst. Veg. ed. 14. In Japonia, China ♄.



COFFEA ARABICA LIN. Cl. V.

IL CAFFÈ.



CCLVIII T. 138



Aristolochia longa vera Officinarum. Aristol. longa Linn. Cl. XX.
A. foliis cordatis, petiolatis, integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, flori-bus solitariis. Sp. Pl. 1364. Vires: Optimum abstergens radicum decoctum.

ann. 1790 [illegible] fecit





Asarum Officinarum

Asarum- europœum. Linnæi Classe XI.
A. foliis reniformibus obtusis binis.

Viribus: Ipecacuhanæ succedaneæ sunt huius radices sed majori datæ dosi. Egregium errhinum sunt folia tabaco immixta. Bl. - Gabr. fec.



CCLX T. 140



Uvæ Ursi ramusculi abscissi uti in Floræ Danicæ. tab. 33. fasc. 1.

Uva Ursi Officinarum vera.

Arbutus-Uva Ursi; caulibus procumbentibus, foliis integerrimis Linnæi Cl. X. Sp. Pl. p. 566. Vires: in calculosis tuto præstatur optimo cum eventu. &c.

sec. Cabrinus. ann. 1790

CCLXI T. 141



Vitis Idæa Officinarum.

Vaccinium-Vitis Idæa; racemis terminalibus nutan-
- tibus, foliis obovatis revolutis integerrimis sub-
- tus punctatis. Linnæi Classe VIII. Sp. Pl. 500. p.

Vires.

Foliorum decoctum ad ambusta laudatur.
Infusum theiforme in catarrhis exhibetur.
ex Hallero.

ex Floræ Danicæ fasc. 1. desumps. Aloys. Cabrinus



CROTON TINCTORIUM

Linnæi class. XXI

In itinere ann. 1791. mens. 7bris per appeninos montes ex Marchia ad Umbriam ducente, suscepto Aloys. Cabrinus invenit prope Oppidulum dic-tum di Polveriggi, hincq' rudit. delineavit anno eodem Maceratæ.

TAB.



CCLXIII T. 143



flos pentandrus naturalis

Solanum nigrum Linnæi Cl. V.

Al. Cabrinus fecit 1791

CCLXIV T. 144.



Calendula-officinalis Linn. Cl. XIX.

a. flosculus naturali magnitudine
b. Semiflosculus

c. Calyx } naturali magnitudine
d. Semen }

Al. Cabrini fecit Maceratæ

CCLXV

T. 145.




Flos icosandrus naturali magnitudine



Prunus spinosa L. cl.XII

fec. Cabrinus aloys. 1790



Ageratum officinarum.

Achillea-Ageratum; foliis lanceolatis obtusis acute serratis Linnaei
Classe XIX. Sp. Pl. p. 1264.

Vires.

Anthelmintica censetur, ac si hodie
absoleverit.

facit Al. Cabriny Maceratae





ROSA-GALLICA Linnæi Cl. XII
Rosa rubra Officinarum.
—— provincialis Dodonæi.

Macerata sub directione Aloys. Cabrini Botan.

CCLXVIII. T. 148



Geranium- malacoides Lin.

G. pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. Syst. Veget.
Adnot. petioli oppositi; altero breviore.
Habit. in Italiæ, Galliæ Narbonensis, Angliæ maritimis. ☉

INDEX
PLANTARUM BOCCONE

A

Abrotanum fœmina incanum albo &c. — — folio — . LX.
Abrotanum fœmina tomentosum crispum . — — - - — — . CXXXII.
Abrotanum tenuifolium incanum minimum . . - - - - . CXLII.
*Absynthium pumilum palmatum minus &c. - - - - . CXXXVI.
Acetosa Ari rotundo folio . — — — — — — . CCXXXIX.
Acetosa minor lobis multifidis . . - - - - - - - . CCXLI
Acetosa Fagopyri folio . . — . — — — — — . ibid.
Acetosa flagellis non ramosis . — — — — — — — . CCXLII.
Acetosa malus Limoniæ foliis . - - - — — . ibid.
Achillea Sideritis ad caulem baccifera . — — — . CCXV.
Alchimilla alpina lobis fimbriatis . - - - - - - - - . III.
Alyssum incanum erectum siliqua utriculata . - - - . CXXI
Allium saxatile Acori radice flore purpureo . - - - . CLIII.
Alnus montana Ulmi folio . - - - - - - - - - - . CLXXXIII
Alnus montana denticulato crispo folio . . - - - - - . ibid.
Alnus lato crispo folio . - - - - - - - - - - - . ibid.
Alsine orbiculatis foliolis . - - - - - - - - - . CLXXVII.
Amaranthus minor spica singulari albo purpureo &c. - CXXV.
Amaranthus foliis acutis incanis Molluginis &c. — LXX.
Anagallis erecta Buguli foliis fructu rotundo — LXI
Anchusa angustis dentatis foliis . - - - - - - . CLVIII
Anagallis polygoni folio . c . . - - - - - - . CCVII.
Ageratum officinarum . - - - — — — . CCLXVI
Anchusa cretica mitior . - - — — — . CCX
Anchusa angustis villosis foliis . - — — — . CL
Androsemum Nummulariæ folio . - - — — — . CLXXIII.
Androsæmum montanum minus . - — — — . LXXXII.
Androsemum Sambac amplo perfoliato folio — . CCXLIII
Anthemis Sofiæ foliis . — — — — . CCXII.
Anthillis Lentifolia Scorpioides . — — — . CLXXXI
Anthilloides rotundifolia sicula Euphrasiæ florib. &c. - XLIV.

Index
Plantarum Boccone

A

Antirrhinum latifolium pallidum amplo flore — LXXIV.
Apparine aquæ innatans trevisana fol. Perchepier &c — VII
Arctium montanum angustifolium hispanicum — CXXX.
Arisarum minus proboscideum. — XCIV.
Aristolochia longa vera officinarum. — CCLVIII.
Asarum officinarum. — CCLIX.
Asplenium lucidum melitense — CLXVII.
Aster conyzoides angustis Linariæ foliis. — CXXVII.
Aster montanus angusto nervoso Plantaginis folio — XXXIV.
Aster supinus lignosus. — CCXLVIII.
Atractylis multicaulis cornucopioides. — CLXXXVI.
Atractylis pyramidalis foliolis crispis — CLXXXV.

B

Barbarea montana integro folio — CLXVIII.
Beccabunga alpina angustifolia repens — XII.
Been album Fabariæ foliis — CLXXVI
Bellis foliolis ad caulem adnatis — CCXXI.
Bellis foliolis laciniatis ad caulem adnatis — CCXXXVIII.
Bellis montana ramosa glabra Chrysanthemi &c. — LIV.
Bellis minima pratensis caule folioso. — LXII.
Bellis incana Chrisanthemi cretici folio — CLXXXVII.
Bellis maritima minima Roris solis folio &c — CCV.
Betonica montana lutea latifolia. — CXXXIX
Blitum angustifolium verticillatum. — CLIV.
Brassica sylvestris albido flore nutante siliqua — CXXXVIII
Buglossum scorpioides hirsutum flore cæruleo — CCXLIX.
Bugula ungarica. — CCXLVIII.
Bugula ungarica glabra — CCXV.

C

Calamintha montana præstantior flore purpureo. — LXXII.
Calamintha montana præalta Pulegii odore — LXIX. et LXXI.
Chaly lignosum. — CCXI.
Chaly vermiculatum albo globoso flore — CCXXXIV.
Chariophyllata alpina tenuifolia — CCXLVI.

Index
Plantarum Boccone

C

Calcitrappa amplo Iaceae capitulo &c. folio . L I.
Campanula alpina caule folioso. - - - - - CXCVII.
Carlina angusto, longo et incano folio, alpina — XXVIII
Carlina cornucopioides. . - - —— — —— —— CCXXXIX.
Caryophyllus alpinus crasso Linariae folio — — VIII.
Centaurium minus leptophyllum polyanthes &c. - LXXIX
Centaurium alpinum glabro angusto Bistortae folio - CIII.
Centaurium montanum neapolitanum B. —— CXVIII.
Centaurium minus luteum angustifolio &c. — CXLVI.
Centaurium angustifolium neapolitanum - - - CXCIII. CXVIII. B.
Cerefolium rugoso Angelicae folio aromaticum - XXXVI.
Chaly polygonoides frutex polyspermon - - - - CXLI
Chamaeleon alpinus Sonchi spinosi folio - - —— CCI.
Chamaeleon alpinus Sonchi spinosis foliis var. nigra - L II.
Chamaestaechas hyspanica. - —— ——— XLVIII. et XCVIII.
Chamaecistus supinus Hyssopi foliis villosis - —— XX
Chamaecistus luteus tereo folio hyspanicus —— CXLII.
Chamarhododendros ferruginea supina &c. — C
Chondrilla cyanoides lutea Coronopi folio n. diviso - CXXIII
Chrysanthemum exoticum incano Cinerariae lucido fol. VII
Chrysanthemum Cinerariae folio - ——— CLII.
Cicutaria bulbosa esculenta - - - - —— CCXXXV.
Clinopodium alpinum roseum &c. - - ——— CLXXXII.
Cistus humilis compactis in verticillos &c. —— CXIX.
Clinopodium minus Pulegii odore romanum — LXXXIV.
Clinopodium perenne Pulegii odore B. ——— ibid.
Clinopodium montanum Casp. Bauh. - ——— ibid.
Clinopodium nigricantibus foliis siculum —— CLXX.
Contrajerva Gentianae affinis - - —— —— CCXXXII.
Convolvulus villosus rectus argenteus —— CLXXXIV.
Convolvulus saxatilis erectus villosus &c. —— CXXXIII.
Convolvulus longifolius azureus, niveo &c. A — CXVIII
Convolvulus minimus angusto auriculato folio — LVIII.
Convolvulus minimus angusto brevi folio —— LIX.

Index
Plantarum Boccone.

C

Conyza prealta odorata alato caule capitulis barbatis Baccari Monspell. æmulans CCXXXI.
Conyza marina tuberosa lutea - - - - - - - CXXIX.
Coris lutea Ericoides fruticans hyspanica - - - CXLIII.
Cotyledon pyramidale polyanthos - - - - - - - CLXIV.
Cyanus alpinus capitulo reticulato - - - - - - IV.
Cyanus montanus caule folioso - - - - - - - V.
Cytisus præcox spicatus rubello flore, caule rubro. XXXV.
Cytisus nanus frutescens totus incanus &c. — — LXII.

D

Digitalis Verbasci folio - - - - - - - - - CLXIII.
Digitalis angustifolia hyspanica — —— CLXXXVII.
Dipsacus giganteus tetraphyllus et triphyllus — XCVII.
Echium scorpioides alpinum tomentosum, nanum CCV.
Eruca hirsuta Papaveris folio - - — — CCXXX
Eruca parva Iberidis folio sicula - - —— CXCVI.
Eruca hirsuta Bellidis sinuato folio. —— CLXXII.
Erucula flore rubello hyspanica —— CLV.
Erucula hirsuta floribus albis - — —— CLIV.
Eryngium minimum hyspanicum et italicum — CXXXV.
Euphrasia erecta foliis subrotundis - - —— XVI.
Euphrasia tenuissime dissecto folio - - — —— CXII.
Euphrasia minima lutea - - — —— — — ibid.
Euphrasia vermiculato folio hispanica - - — —— CXVII.
Euphrasia lignosa præalta amplo Linariæ folio — CCVIII.
Ferula durior seu rigidis et brevissimis foliis — CXLVII.
Filix florida minor hispanica — — —— —— XCIII.
Fucus marinus arundinaceus dulcis - —— CCLI.
Fumaria henneaphyllos hispanica saxatilis - — CXL.
Fumaria exilis romana —— —— CLVI.
Fumaria foeniculi tenuiori folio romana - — — CXCVI.
Fungus caule nigro - —— —— CXCIX
Fungus disco punctato - - - - —— CCVI.
Fungus turbinatus - - - - - - —— CCXI.

Index
Plantarum Boccone.

Gallium villosum supinum retuso folio — CCXXII.
Gallium saxatile glauco folio. . . . . ibidem.
Gallium villosum. . . . . CLXV.
Gentianella purpurea Violæ Marianæ flore . . X.
Gentianella Bellidis folio. A . . . . . . CXCIV.
Gentianella Pirolæ folio. CCXXVII
Geranium Botrys folio . . . . CCIX.
Geranium minimum Chamædrioides . . . . . CCXLV.
Geranium crasso Batrachioides folio. . . . . . ibid.
Geranium malacoides crasso rugoso integro folio CLXX.
Geranium montanum rotundifolium perenne &c. CXXXVII.
Geranium Cicutæ folio ramosum. CLVIII
Geranium Chrysanthemi cretici folio. — CLX.
Ginseng sive Ninzi radix. — CCLII
Glaux e Lythi tarentinæ folio. . . . . . CCXXVII.
Glaux altera subrotundo folio. B. CLXI
Glaux major palustris flore herbaceo . . . ibid.
Glastivida vide Hippophestum. CLXXI
Gramen paniculatum odoratum. CLXXIII
Gnaphalium supinum . . . . C.LXII
Gramen maritimum paniculis asperis loliaceis. CLXXXI
Gramen supinum brevi, hirsuto folio &c . . . CIII.
Gramen supinum minimum Chamædrioides. . . . CV.
Gramen pusillum unicaule panicula loliacea B. . CVI.
Gramen pomorum et Meliloti redolens. A . . ibidem
Gramen erectum unica spica avenacea. D . . ibidem
Gramen exile arundinaceum minimum acumine -
reflexo. C. . . . . ibidem.
Gramen nigricans erectum minimum arundinaceum CIX.
Gramen cyperhoides et villosis spongiolis ad singula ge-
-nicula donatum . . . . CX.

Index
Plantarum Boccone

Gramen omnium minimum loculis arenariæ ..... CX.
Gramen lanceolatum siculum. ..... CLXVII.
Halimus Nummulariæ mediò folio CXCI
Halimus supinus Polygoni folio. CXCII
Helichryso sylvestri similis tota viridis. CCIX
Helichrysum saxatile ..... CXCIX.
Helichrysum siculum trifidis foliis asperiusculis. ..... LXVI.
Helleborus niger sanguineo folio. ..... XXII.
Heptaphyllum trifoliatum argenteum italicum. ..... XV.
Heptaphyllum alpinum trifoliatum sabaudum. ..... XVIII.
Hieracium Bursæ pastoris foliis. CCXVI
Hieracium montanum Endiviæ folio CCXVII
Hieracium alpinum incanum saxatile Prunellæ fol. XLIII
Hieracium montanum malicotoneæ folio XCIX
Hieracium montanum Jaceæ integro folio ..... CII.
Hieracium Bursæ pastoris folio. ..... CCIII.
Hieracium tomentosum integro folio. CCIV
Hieracium Tragopogoni folio. ..... ibidem
Hieracium Asphodeli foliis. ..... ibid.
Hippophestum Cæsalpini. ..... CLXXI.
Horminum nigrum Menthastri folio. ..... CCL.
Horminum subrotundo folio flore cæsio hyspanicum. XXVII
Hypericum guttis sanguineis XXII
Hypericum crispum triquetro et cuspidato folio ..... XXIV. et XXV.
Hypericum Myrthi acuto folio ..... CLXXIV. et CLXXV.
Hyssopus montana verticillata minor. ..... CXXVI.
Jacea saxatilis longo incano angusto Heliochrysi cretici folio. ..... XXXIII.
Jacea supina maritima laciniata capite spinoso &c. — XLVI. et XLVII.
Jacea intibacea capite rubro spinoso. ..... XC. CLXXX. et CCLIII.
Jacea hispanica latifolia nervis foliorum lanuginosis — CII.
Jacea Stœchadis folio flore luteo. ..... CXXI.
Jacea major pineis foliis luteo flore capite spinoso — CXLVI.

Index
Plantarum Boccone

Jacea incana Chamæleonis capitulo . . . . CCIX.
Jacobæa pumila alpina . . . . XV.
Jacobæa Linifolia hyspanica et italica XCI
Jacobæa montana integro rotundo folio XCII
Jacobæa montana Betonicæ folio . . . . . . ibid.
Jacobæa erecta angustifoliis dentatis sabauda . . CLVII
Jacobæa humilis Senecionis folio . . . . CXCI.
Jacobæa spinosa brevi Leucoj folio . . . . . . CCLI.
Jonthlaspi seu Leucojum montanum luteum . . . CXXVIII.
Lamium subrotundo rugoso folio flore rubro . . . XLII.
Lapatum aquaticum Luteolæ folio CC
Ledum folio Sampsuci XXVI
Leucojum minus purpureum breviori folio, obsoleto flore CXXIV
Leucojum minus purpureum angustifolio longiori . ibid.
Leucojum minus angustifolium luteum CCXIV
Leucojum minus Lavendulæ folio . . . . ibid.
Leucojum minus fruticans purpureum . . . . . ibid.
Leucojum montanum crucigerum Coronopi folio . CCXIII.
Libanotis Ferulæ folio et semine italica . . . . CCXXXVI.
Libanotis tenuifolia Foeniculi semine italica . . CCXXXV.
Libanotis alpina latifolia semine crispo . . . . . . VI.
Limonium flagellis fæniculaceis . . . . CXCVIII.
Limonium flagellis tortuosis . . . . ibid.
Lingua cervina polyphylla polyschides . . . . . CXCV.
Linum sylvestre fruticans trichodes Thymi fol. anteg. poly: LXXXVII.
Linum sylvestre minus flore cæsio, foliis verticillatis . . . LXXVI.
Linum oxyphyllum polycaule . . . . CCXL.
Lychnis maritima supina Cepeæ foliis CCXXV
Lychnis erecta Veronicæ foliis . . . . ibid.
Lychnis hirsuta crasso folio . . . . ibid.
Lychnis corniculata minor seu angustifolia saxatilis . . . LXXX
Lychnis corollaria umbellifera alpina flore purpureo . . LXXV
Lychnis maritima pinguis ex Corsica . . . . . CI.
Lychnis rubra montana Globulariæ capitulo. A. . CXV.

Index
Plantarum Boccone

Lycium indicum foliis Ericæ . . . . CLVII.
Lychnis fruticosa angustifolia minima, flore albo . . CXXXIV
Lycopsis spatulæ folio hispanica et sicula . . . . CLI.
Lycopsis angustifolia minor. . . . . ibid.
Lysimachia alpina glabra ramosa Violæ surrectæ = XXXII
= foliis splendentibus. . . . .
Lysimachia siliquosa alpina erecta Alsine foliis — XXX
Lysimachia siliquosa trifoliata alpina purpurea . . IX.
Marrubiastrum Cardiacæ folio. . . . . CLXXXVIII.
Marrubium album sericeo parvo et rotundo folio . . CXXXI
Marrubium hyspanicum rotundifolium album, majus . CCXXXIII.
Marum tenuifolium Thymi facie hyspanicum. . . . XXVI.
Marum Thymifolium incanum spicatum crenato =
= folio Pulegii odore hyspanicum. . . . . . XCIV.
Marum hyspanicum nigrum . . . . CCXXIV.
Melampyrum minus purpureum Trissaginis folio . . XCV
Melissa sylvestris hirsuta major. . . . . CCXXIV.
Mentha cattaria rhomboidali folio. . . . . . ~~CCX~~ CCXIX
Milium nodosa radice . . . . CLXVII.
Millefolium tomentosum obsiatum. CCXXIX
Muscus montanus Adianthi foliis . . . . . . IV.
Muscus cornucopioides cristatus . . . . . . XVI.
Muscus marinus crispus virens et gilvoluteus . LXXVII.
Muscus saxatilis incanus . . . . CLXXVI.
Muscus odoratissimus . . . . ibid.
Muscus arboreus coralloides auriculatus . . CLXXXII.
Muscus labellis croceis CICIX
Muscus corniculatus fistulosus CCV
Muscus cornucopioides cristatus . 6. 6. . . . . CCVI.
Muscus cupressinus . . . . CCVIII.
Nasturtium alpinum Resedæ folio LXXXV
Nasturtium montanum Bursæ Pastoris folio &c. . . . CLX
Nasturtium rotundo Thalictri folio . . . . . CCXXI.

Index Plantarum Boccone

Nepeta angustifolia minor Hispaniæ et Italiæ . CXIII.
Nepeta montana purpurea major sparsa spica . LXV.
Nepeta saxatilis cærulea minima hyspanica LXIV.
Nepeta tuberosa spicata purpurea hyspanica . LXIII.
Nepeta viridis . . . . CLXXV.
Onobrychis flagellis longissimis . . . . . CCXLVII.
Ononis non spinosa rotundifolia spicata purpurea hispanica . LXXXIX.
Origanum lignosum Siracusanum, umbella am=
=plissima . . . . LXVIII.
Panax alpina Ebuli laciniatis foliis . . . . CXC.
Panax heracleum tenuius incisis foliis . . . . . CLXXXIX.
Papaver rhœas integro folio hyspanicum . . . CXXII.
Pastinaca tenuifolia lucida gummi manans . . XXXVII.
Pentaphyllum alpinum minimum profunde dissectum . II.
Perfoliata humilis alpina . . . . CXVIII.
Persicaria alpina folio nigricante floribus albis — XLIX.
Persicaria altera Lepidii Pauli foliis . . . CLIX.
Phyllum foeminificum Alaterni brevi glabro folio CCIX.
Pimpinella auriculata sabauda rigida . . . . XVII.
Pistacium mas . . . . CLXXVIII.
Pistolochia minima incana . . . . CLXVIII.
Plantago alpina folio nigricante IX
Polygonum montanum niveum vasculum minimum . XIII.
Polygonum fruticans maritimum crassioribus flagellis LXXIII.
Polygonum majus flagellis donatum . . . . CVII.
Polypodium majus acutis foliis Sicviense . . . . LXXXVII.
Polypodium minus acutissimis foliis Corsubense . LXXXV.
Polypodium aureum acaule . . . . . . CCVI.
Polium saxatile chamædryoides ampla coma . CXIV.
Polium saxatile chamædryoides rotundifolium spi=
=num flore rubello . . . . CXVI.

Index
Plantarum Boccone

* Pseudo Dictamnum nigro rotundo, crispo folio = in Libri frontispitio et pagina . . . CCLI.
* Pseudo-Dictamnum seu Marrubium nigrum si= =culum Paleopsidi Anguillara respondens. CCXVIII
Pseudo Stachys Menthæ cattariæ folio. A . . . CVIII
Ptarmica alpina . . . . CLXII.
Ptarmica Millefolii foliis alpina . . . . CXCIII.
Ptarmica Matricariæ foliis . . . . . . CCXII.
Pulmonaria alpina angusto folio. CLXV
Pulmonaria Fragariæ odore. CCII
Pulmonaria viridis non maculata subrotunda . . CLXXXII.
Ranunculus Tribuli aquatici foliis CCXXXVII
Ranunculus radice tuberosa reticulata . . . ibid.
Ranunculus Teucrii folio rhomboidali . . . . CXIV.
* Rapunculus aquaticus minimus repens alpinus Bel= =lidis folio flore caeruleo inaperto . . . L.
Rubeola saxatilis alpina . . . . CXCIV.
* Rubia laevis Linifolia floribus albis Montis virginis (neapoli) . CXLV
Rubia minor quadrifolia atrovirens saxatilis . . CXLIV.
Rubiola montana . . . . LXXXVIII.
Rutha montana spinosa alba. . . . . CIX.
Rutha sylvestris Linifolio hyspanica . . . CXLI.
+ Salix alpina Alni rotundo folio repens. . . . II.
Salix alpina Serpilli folio lucido. . . . . . . III.
Satureja saxatilis compactis foliis CCXXVIII
Saxifraga rotundifolia flore albo. . . . . . CLV.
Scabiosa alpina Hieracii folio . . . . . . CCXXX.
Scabiosa montana repens Valerianæ æstivæ folio longius radicata, floribus dilute rubris odoris. . . LXXXVI.
Scabiosa hirsuta multifida alpina, supina . . . XI.

Index
Plantarum Boccone

Scorpioides Galegæ foliis . . . . . . CCXI.
Scrophularia Laserpitii folio CCXXIII
Scrophularia capsula turgida . . . . . . CXI.
* Sempervivum omnium minimum repens Polygoni facie XL.
* Serpentaria virginiana . . . . CCVII. et CCXX
Serpentaria minor Arisari angustifolii foliis . . . . . CLXVI.
Serpillum pannonicum III Clusii . . . . CLXXI.
Serpillum saxatile nanum . . . . . CLXXI.
* Serratula præalta Centauroides montana italica . . LXVII.
* Serratula præalta angusto Plantaginis aut Persici folio . LVII
Sideritis Salviæ foliis . . . . CCXLIV.
Sideritis incana Oleæ foliis . . . . . CCX. et CCXV.
Sideritis glabra montana . . . . CXCVII.
Sideritis montana Lamii folio rugoso . . . CIV.
Sideritis montana erecta Salviæ glabro folio . . . XXXVIII
Sideritis alpina Chamædrioides tomentosis foliis . . XXXIX
Sideritis alpina Chamædrioides glabra . . . . XLI.
Solanum vesicarium minimum bacca lutea . . XCV.
Sonchus pyramidalis Pratolini . . . . . LVI.
Spartium setulis tenuissimis . . . . . CLXXXVI.
Spiræa Hyperici folio CLXXXIV
Spiræa altera floribus expansis . . . . CLXXXIV.
Stæbe incana acutis foliorum radiis . . . CCXXVIII.
Stellaria punctata minima Lepidotes dicta . . LVII.
Tanacetum album tenuifolium flore candido . XLV.
Taraxacum saxatile . . . . CCIII.
Tea sinensium sive Tsia japonica . . . CLXXIX
Thalictrum Batrachioides minus . . . . . CLII.
Thapsia alpina lucida Thalictri seu Carotæ foliis flore albo CXLIX
Thlaspi luteum Leucoij folio . . . . . . CLXXVI.

Index
Plantarum Boccone

Thlaspi Hierico sylvestri affine . . . . . CLXXXVIII.
* Thlaspi biscutellatum luteo Anchusæ folio . . CCXXXIV
Thlaspi Leucoi folio acuminato . . . . CCL.
Thlaspi flore albo siliqua triangulari crenata CXXXII.
* Thlaspi fruticosum Leucoi folio latifolium platy=carpon = LIII.
* Thlaspi parvum Halimi angusto folio et argenteo LXX
Thlaspi minimum tomentosum angusto Leucoi folio = =floribus luteis . . . LXXXIII.
* Thlaspi Thymi folio, utriculo subrotundo mucrona=to hyspanicum = CXV.
Thlaspi montanum album siliqua rostrata acuto= =Globulariæ folio CXX
* Thlaspi luteo Leucoy flore . . . CXXVI.
Thlaspi fruticans erectum angustifolium utriculis sub= rotundis CXXVIII.
Thlaspi linium erectum flore albo turbinato utriculo = italicum CXXXI.
* Thymus Halioni CLXXI
Tithymalus arboreus tuberosa radice . . . CLXIX.
Tithymalo Cyparissiæ affinis lato Leucoy folio &c. XXIX
Tithymalus dulcis tuberosa radice italicus . . . LXXXI
Tillæa muscosa . . . . XL.
Trachelium Pulmonariæ folio . . . . . CCXLIV.
* Trachelium saxatile Bellidis folio cæruleo flore &c. CXIX.
Trachelium oblongo folio alpinum. B. . . . . CVIII.
Tragoriganum Dictamni capite hyspanicum — LXXVIII.
Tragoriganum apulum. . . . . . . CLIX.
Tragoriganum brevi circinnato folio . . . CCXXXVIII.
Trifolium nodiflorum . . . . CC.
Trifolium fructu racemoso CCXXXVIII
Trifolium acetosum americanum. . . . XCVI.
Turritis foliis caulem ambientibus . . . LXXIII.
* Veronica alpina pumila caule aphyllo . . . II. et XVIII.
Veronica alpina repando Alsines Plantaginis folio XIV
* Veronica minima Chenopodii minoris folio romana — XVIII et CXCVI.
Veronica fructescens durior patavina . . . XIX

Index
Plantarum Boccone

Veronica mas alpina, glabra, erecta . . . . . XXI.
Virga aurea alpina lunini rigidioribus foliis . . XXXI.
Virga aurea longo, molli et laciniato folio alpina . LV
Virga aurea montana minor . . . . . . CCXXVI.
Viola alpina Nummulariæ folio . . . . . CCXLIIII.
* Vitis idea officinarum. CCLXI
* Uva ursi officinarum . . . . CCLX.

Finis.

Index Linnæanus

Absynthium-Boccone	ex tab. 71.	CXXXVI.
Achillea-Aggeratum	tab. 146.	CCLXVI.
Achillea-nana		CCXXIX
Achillea-macrophylla		CCXII.
Achillea-alpina		CXCIII
Achyranthes-corymbosa		LXX
Aegilops-incurvata		CIX
Agaricus-androsaceus		CXCIX
Agrostemma-Flos Jovis		LXXV.
Alchemilla-pentaphyllæa		II.
Allium-senescens.		CLIII
Alyssum-Halimifolium		LXX.
Alyssum-montanum	tab. 62. 67.	CXV. et CXXVI.
Alyssum-saxatile		CLXXVII.
Anastatica-syriaca		CLXXXVIII.
Angelica-Razuli		CXC.
Anchusa-undulata		CXLVIII.
Anthemis-austriaca		XLV.
Anthemis-montana		CLXXXVII
Antirrhinum-majus		LXXIV.
Anthoxanthum-odoratum A.		CVI.
Arabis-Bellidifolia		LXXIII.
Arabis-Turrita		CXXXVIII.
Arbutus-Uva ursi.		CCLX.
Aristolochia-longa		CCLVIII.
Arum-proboscideum		XCIV.
Asarum-europæum		CCLIX.
Azalea-procumbens		C.

Index Linneanus

Bellis - annua . . . . . . LXII.
Bellium - bellidioides CCV
Betonica - Alopecuros CXXXIX
Biscutella - sempervirens CCXXXIV
Bubon - rigidius CXLVII
Calendula - officinalis CCLXIV
Campanula - Erinus CCLIV
Campanula - rhomboidea CXIV
Campanula - saxatilis CXIX
Campanulæ - glomeratæ : Varietas B . . CVIII.
Campanulæ - rotundifoliæ : Var. . . . CXCVII
Cardamine - Bellidifolia CLXVIII
Cardamine - Resedifolia . . . . . LXXXV.
Celosia - castrensis . . . . . . CXXV.
Centaurea - uniflora . . . . IV.
Centaurea - montana . . . . V.
Centaureæ - amara varietas XXXIII
Centaurea - aspera . . . . XLVI.
Centaurea - nudicaulis . . . . . . XC. et CCLIII.
Cheiranthus - tristis . . . . CCXIV.
Chærophyllum - aromaticum . . . . . XXXVI.
Cineraria - longifolia . . . . . . XCII.
Cistus - squamnatus . . . . CXIX.
Coffea - arabica . . . . CCLVII.
Convolvuli - arvensis varietas . . . . LVIII.
Convolvulus - cneorum . . . . . . CXXXIII.
Conyza - saxatilis . . . . CXCIX.
Crepis - Bursifolia . . . . CCIII. et CCXVI
Croton - tinctorium . . . . CLXII.
Cucubalus - fabarius CLXXVI

Index Linneanus.

Daucus- gummifer . . . . XXXVII.
Digitalis- obscura . . . . . . CLXXXVII.
Digitalis- Thapsi . . . . . . CLXIII.
Epilobii- montani var. . . . . . IX. et XXXII.
Epilobium- alpinum B . . . . CCVII.
Eryngii- amethistini Var. . . . . . CXXXV.
Euphorbia- dulcis. . . . . . . LXXXI.
Fumaria- enneaphylla . . . . . CXL.
Gallium- aristatum . . . . . CXLV.
Gallium- Boccone . . . . . . CXCIV.
Gallium- glaucum . . . . . . CCXXII.
Gentiana- acaulis . . . . . . X.
Gentiana- maritima CXLVI
Geum- reptans CCXLVI
Geranium- malacoides . . . . . CCLXVIII.
Geranium- pyrenaicum CXXXVII
Gnaphalium- supinum CLXII
Gypsophila- altissima VIII
Gypsophila- Strutium . . . . . . CCXXXIV.
Hellebori- viridis- variet. . . . . . XXII.
Helleborus- foetidus. XXIII
Heracleum- elegans . . . . . . CLXXXIX.
Hieracium- pumilum . . . . . XLIII.
Hieracium- porrifolium . . . . . CCIV.
Hypocheris- pontata . . . . . . CCXVII.
Hyoseris- scabra . . . . CCIV.
Hyoseris- taraxacoides . . . . . CCIII.
Hypericum- nummularium . . . . . CLXXIII.
Hypericum- crispum . . . . . . XXIV. et XXV.
Hypericum- maculatum . . . . . . XXII.

Index Linneanus

Iberis - semper florens . . . . . . LIII.
Inula bifrons . . . . CCXXXI.
Inula - ensifolia XXXIV
Isnardia - palustris . A . . . . . CLXI.
Isopyrum - thalictroides . . . . CLII.
Lamium - laevigatum XLII
Laserpitium - latifolium . . . . VI.
Lichen - ericetorum . . . . . CCXI.
Lini tenuifolii variet. . . . . CCXL.
Linum - verticillatum LXXVI
Leonurus - marrubiastrum CLXXXVIII
Lobelia - Laurentia L
Lobelia - minuta 161

[illegible]

1 [illegible]
2 [illegible]
3
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible]
8 Mutum
9 [illegible]
10 [illegible]

